

『동의보감』 맥진 의안 고찰 및 맥진 장부 定位에 대한 浮中沈 배속법 제안

임승일¹, 박훈평², 나창수^{1*}

1. 동신대학교 한의과대학 진단학교실

2. 동신대학교 한의과대학 원전학교실

Abstract

Investigation of the case on the pulse diagnosis of *Dongueibogam* and proposal of Inch-Bar-Cubit assignment for organ positioning in pulse diagnosis

Seungil Lim¹, Hunpyeong Park², Changsu Na¹

1 Department of Diagnostics, College of Korean Medicine, Dongshin University

2 Department of Korean Medical Classics, College of Korean Medicine, Dongshin University

Objectives

In order to reinterpret the meaning of Inch-Bar-Cubit used by pulse diagnosis, this study investigates floating pulses of lung and heart in the Inch area, middle pulse of spleen and livers in the Bar area, and deep pulse of kidney and life gate in the Cubit area. However, some suggested that the meaning of Inch-Bar-Cubit should be interpreted in the same way as floating-middle-deep.

Methods

In this study, the contents of Inch-Bar-Cubit assignment of pulse diagnosis proposed by *Dongueibogam* and Medical Scientist were investigated along with the existing investigation of pulse diagnosis, and their interpretation was investigated.

Result and conclusion

The assignment of books in Pulse diagnosis can be applied by replacing them with floating-middle-deep instead of Inch-Bar-Cubit.

Key words

Pulse diagnosis, Inch-Bar-Cubit(寸關尺), Floating-middle-deep(浮中沈), Organs, Positioning, Assignment

* 교신저자 : Changsu Na / Department of Diagnostics, College of Korean Medicine, Dongshin University, 136, Dongshindae-gil, Naju-shi, Cheollanam-do, 58245, Republic of Korea

Tel: +82-10-4662-3522, Fax: +82-61-330-3502, E-mail: nakugi@hanmail.net

• 원고접수일 : 2021. 04.15 / 심사완료일 : 2021. 04.25 / 게재결정일 : 2021. 05.08

I. 서론

한의학은 “한국에서 기원하고 꾸준한 교류를 통해 발전한 인체의 구조·기능을 탐구하여 보건의 증진, 질병의 치료·예방 등에 대한 방법과 기술을 연구하는 학문”¹⁾이며, 현 시점에서 한의학은 현대의 인식과 사고를 바탕으로 연구해야 하는 ‘현대한의학’이어야 한다.

한의학에서 현재 주로 사용되고 있는 맥진은 寸口診法이다. 寸口란 氣口, 脈口라고도 하며 손목 뒤 高骨(요골의 경상돌기 근위부의 돌출 부위) 안쪽으로, 요골동맥이 통과하는 자리이다. 따라서 이 寸口部位의 脈動 즉, 脈의 움직임을 촉진하는 것이 寸口診法이다. 寸口診法에 있어서 五臟 定位는 五臟의 診斷點 位置를 확정하는 것이다. 오장 定位에서 오장은 장기의 실체를 말함이 아니며 臟象에서 그 계통을 지정한다²⁾. 현재 한의학계에서 가장 많이 쓰이고 있으며 정통적인 맥진의 오장 定位法은 촌관척 장부배속이론에 따른 정위법이다³⁾.

촌관척 장부배속이론은 寸口 부위를 촌관척 세 부분으로 나누어 高骨을 기준으로 그 내측 부위는 關이 되고, 關의 앞부분(손목 쪽)은 寸, 關의 뒷부분(팔꿈치 쪽)은 尺이 되며 좌측과 우측이 합하여 六部脈이 된다. 좌측의 寸은 心, 關은 肝, 尺은 腎, 우측의 寸은 肺, 關은 脾, 尺은 命門(心包)으로 배속되어 ‘五行子母相生’의 규칙이 적용되어 있다.

촌관척 배속법에 따른 임상례로 『다시 생각해 보는 한의학』⁴⁾의 「寸口脈分候臟腑別議」에 따르면 3,705개 醫案 중 脈象이 기록된 것은 2,690례이며, 이중 ‘六脈分屬臟腑定位’ 이론에 부합하는 예는 170례로서 부합률은 6.3%이다. 또, 外感時病의 정황에 있어서도 脈象이 기록된 309례 가운데 ‘六脈分屬臟腑定位’ 이론과 부합하는 예는 25례로 부합률은 8.1%이다. 이는 기존의 한의 임상에서 실제 촌관척 배속법 사용 빈도가 낮음을 보여주고 있다.

본 연구에서는 한의 임상에서 다용되고 있는 『東醫寶鑑』에서 맥진이 표기된 醫案(증례 보고 외에 맥상의 구체적 묘사가 나타난 진술을 모두 포함한다 - 편집자 주)을 조사하여 그 중 촌관척 배속법에 따른 맥진 醫案의 비율 등을 조사하였다. 아울러 寸關尺 맥진 방법이 ‘현대한의학’이라는 인식과 사고에 부합되지 않는 점과 임상 실제에서 이를 대신할 수 있는 浮中沈 맥진 방법에 대해 고찰한 결과, 다음과 같은 지견을 얻었다.

II. 본론

1. 『東醫寶鑑』 맥진 醫案 조사 방법

『東醫寶鑑』맥진 醫案 기록을 조사한 방법은 다음과 같다.

1) 1994년 출판된 『東醫寶鑑』(南山堂)을 기준으로 실시하였다.

2) 脈動을 구체적으로 기술한 醫案만을 채택하고, 맥진에 대한 이론적인 기술은 배제하였다.

예시1) p.485 (診脈門) [脈이 크면 病이 增進하는 경우] 脈이 大하면 반드시 病이 增進하니 大라는 것은 洪의 別名이요 火의 象이다.

예시2) p.486 (診脈門) [肥瘦 長短의 異脈의 경우] 대개 肥人은 肌膚가 두껍기 때문에 脈이 沈한 것이요 瘦人은 肌膚가 얇기 때문에 脈이 浮한 法이다.

예시3) p.486 (診脈門) [老少男女의 異脈의 경우] 男子는 左脈이 强하고 右脈이 弱하며 女子는 右脈이 强하고 左脈이 弱한 法이다.

3) 촌관척의 언급은 없지만 ‘陰脈, 陽脈, 三陽, 三陰, 少陰脈, 下部脈, 心脈, 肝脈, 등’ 구체적인 脈의 部位를 표시한 경우는 별도로 조사하였다(별표1에 별도 표시). 다만 ‘六部脈, 右手脈, 左手脈, 兩手, 三部脈 등’은 寸口脈 전체를 지시하므로 별도로 조사하지 않았다.

예시) p. 422 (前陰門) [脈法の 경우] 婦人의

少陰脈이 滑하고 數한 것은 陰孔 가운데 瘡이 난 것이요 少陰脈이 浮하고 動할 경우 浮하면 虛가 되고 動하면 痛이 되며 婦人이면 陰이 脫下한다.

4) 趺陽脈, 人迎脈, 氣口脈 등은 寸口脈診법이 아니므로 별도로 조사하였다. 특히, ‘氣口脈’은 寸口脈임이 확실하나 ‘人迎脈’은 左手의 寸口脈인지, 총경동맥의 脈動인지 異論이 존재하므로 寸口脈診 醫案에서 배제하였다 (별표3).

예시1) p.29 (氣門) [脈法の 경우] 仲景曰 趺陽脈이 微하고 緊할 때에, 緊한 것은 寒한 症이며 微한 것은 虛한 症이고 微와 緊이 相搏하면 短氣가 된다.

예시2) p.174 (小便門) [關格症의 경우] 內經에 가로되 人迎脈이 氣口보다 4倍로 크면 格이 되고 氣口脈이 人迎보다 4倍로 크면 關이 되는 法이다.

5) 醫案 중 病程에 따라 脈象이 변한 경우는 하나의 例로 간주하며, 서로 구별되는 病程이 나타난 경우에는 그 수에 해당하는 例로 간주한다.

예시) p.537 (風門) [破傷風の 脈法の 경우] 瘡脈은 弦直하고 或은 沈細한데 조금 脈을 내어 풀고자 하면 脈의 發하는 것이 마치 뱀과 같으니 弦緊한 것은 오히려 可하거니와 伏緊한 것은 안된다. 이것은 2가지의 경우에 해당한다.

2. 『東醫寶鑑』 맥진 醫案 조사 결과

『東醫寶鑑』 맥진 醫案에 대하여 조사 분석한 전체내용을 별표1과 별표2 및 별표3에 나타내었다. 이에 따르면, 寸口脈 배속법과 맥진 부위가 표기된 醫案(조사 조건3)을 모두 포함한 『東醫寶鑑』의 모든 맥진 醫案의 총수는 1,497개이다. 寸口脈 배속법에 의한 醫案의 개수는 137개이며 寸口脈 외 맥진 부위가 표기된 醫案(조사 조건3)의 개수는 85개이므로, 寸口脈 배속법을 포함한 맥진 부위가 표기된 醫案은 222개이다. 따라서 寸口脈 배속법에 의한 醫案은 137/1,497으로

전체의 9.2%에 해당한다. 『다시 생각해 보는 한의학』의 「寸口脈分候臟腑別議」에서 제시한 비율, 6.3%를 약간 상회하나, 크게 벗어나지는 않는다. 오히려 『東醫寶鑑』은 『醫學入門』과 더불어 寸口脈 배속법을 따르는 유형의 대표적인 의서라는 점을 감안한다면, 寸口脈 배속법에 따르는 맥진법이 10% 미만이라는 것에 그 의의가 있다. 『東醫寶鑑』이 寸口脈 배속법을 따르는 이유는 첫째 許浚이 1581년(선조 41)에 간행된 『纂圖方論脈訣集成』의 저자라는 점이다. 이 책은 기존의 『纂圖脈訣』을 교정한 책이다. 둘째 『脈訣』은 조선시대 내내 의관 취재와 의과의 교재로 활용된 점이다⁵⁾. 『東醫寶鑑』 저술 과정에서 국가의 표준 맥진법을 따를 수 밖에 없었을 것이다.

또, 寸口脈 배속법과 그외 맥진 부위가 표기된 醫案(조사 조건3)은 222/1,497으로 전체의 14.8%에 해당한다. 寸口脈 배속법 외의 맥진 부위가 표기된 醫案의 경우는 寸口脈 배속법으로 해석할 수도 있지만 대부분은 浮中沈 배속법으로 해석된다. 왜냐하면 ‘陽脈, 陰脈, 三陽脈, 三陰脈, 上部脈, 下部脈’ 등은 寸口脈에서 각각 ‘寸과 尺’으로 인식하기보다는 ‘浮와 沈’으로 인식하는 것이 합당하기 때문이다. 또, ‘心脈, 肝脈’ 등 五臟脈이나 ‘夏脈’ 등 季節脈은 浮中沈 배속법으로 얼마든지 이해될 수 있다. 그럼에도 불구하고 이 부분을 조사한 것은 포괄적으로 접근하여 조사함에도 85% 이상의 醫案은 寸口脈 배속법과 전혀 무관한 醫案임을 알 수 있기 때문이다.

이에 『東醫寶鑑』 맥진 醫案에 대하여 조사 분석한 자료를 표1과 같이 얻었다.

『東醫寶鑑』에서 맥진이 기록된 醫案을 조사한 결과, 맥진에 있어서 寸口脈 배속법은 임상 실제에서는 활용이 제한되며, 이론적이고 도식적인 측면이 있다고 할 수 있을 것이다. 따라서 맥진의 오장 定位 및 방법에 있어서 寸口脈 배속법을 대체할 수 있는 방법에 대해 알아보고자 한다.

Table 1. An analysis on the case reports containing pulse diagnosis in *Dongeuibogam*

『東醫寶鑑』 맥진 醫案 분석

	內景篇	外形篇	雜病篇	寸關尺 表記	合計
脈診 醫案	266	212	882	137	1,497
部位 表記 醫案	18	30	37		222

3. 맥진의 寸關尺 배속법 및 浮中沈 배속법

1) 촌관척 배속법의 제한점

寸口部位의 脈動 즉, 脈의 움직임을 촉진하는 것이 寸口診法이다. 寸口診法에 있어서 五臟 定位는 五臟의 診斷點 位置를 정하는 것으로 정통적인 맥진의 오장 定位法은 촌관척 장부배속이론이다³⁾. 그러나 이러한 이론적 전개는 전통적 인식에 머물러 있을 뿐, 현대의 인식과 사고로 볼 때는 다음 세 가지의 제한점이 내포되어 있다.

첫째, 寸口 부위를 좌우로 구분한 것은 左血右氣의 이론에 따른 것⁶⁾으로 인체의 좌우를 각각 血과 氣의 기능적 범주로 나눈 것에 기인한다. 촌관척 맥진법에 따르면 心, 肝, 腎은 血과 관련된 계통이므로 좌측에, 肺, 脾, 命門은 氣와 관련된 계통이므로 우측에 각각 배속한다는 것이다. 그러나 左血右氣 이론은 기능적인 구분일 뿐 氣血이 인체의 좌우에만 각각 기능하거나 존재할 수는 없는 것이다. 따라서 좌측의 寸口脈에 血과 관련된 기능 장애만 나타나거나 우측의 寸口脈에 氣와 관련된 기능 장애만 나타나지는 않음을 알 수 있다.

둘째, 寸口 부위를 촌관척으로 구분한 것은 각각 上焦, 中焦, 下焦에 대응하는 장상으로 定位한 것이다. 여기에는 肝이 下焦에 속함에도 中焦로 배속한 오류가 있지만, 상대적으로 腎보다는 위쪽에 위치하므로 완전히 틀렸다고 볼 수는 없다. 이보다 먼저 寸口 부위를 촌관척, 상하 방향의 세 구역으로 나눈 것이 주요한 문제를 발생시켰다고 볼

수 있다. 이러한 인식은 경락학적인 측면에서 手三陰經은 井滎腧經合의 五輸穴이 말초로부터 經氣가 出溜注行入하므로⁷⁾ 요골동맥에서 상대적으로 말초 쪽이 상대적으로 체간 쪽보다 신체의 위쪽을 대표한다는 관점이다. 이는 전통적으로 한의학에서 인체의 작은 단위(얼굴, 손, 발, 귀 등)의 체표를 인체의 오장육부나 기능체계, 구조물과 연계하는 이론과 관련이 있다. 하지만 이런 이론은 체내를 구조적이나 기능적으로 분별하는 데 과학적인 방법보다는 인식론적인 방법을 사용했던 시대의 산물이다. 특히, 임상에서는 진단과 치료에 있어 절대적이기보다는 방법론적이며 상대적으로 차용되었을 뿐이다⁸⁾. 寸口 부위는 해부학적으로 요골동맥의 일부이며, 연속된 혈관을 구역으로 나누어 상하방향의 촌관척을 오장으로 定位한다고 하는 것은 많은 제한 요소를 가지고 있다고 볼 수 있다.

셋째, 좌측 關部位부터 ‘左寸 - 右尺 - 右關 - 右寸 - 左尺’까지 ‘肝 - 心 - 心包(命門) - 脾 - 肺 - 腎’으로 각각 ‘五行子母相生理論’에 맞게 도식화하고 있다.⁹⁾¹⁰⁾ 인체는 그 구조와 기능계가 매우 다양하고 가변적인 체계이다. 장상론적 방법으로 인체의 구조와 기능계를 오장 계통으로 구분하는 것은 받아들일 수 있는 논리와 인식이다. 다만 맥진의 부위를 좌우와 촌관척으로 구분하여 ‘五行子母相生’이라고 하는 획일적인 이론의 틀 안에 넣는 건강부회의 상황을 초래하였다.

2) 부중침 배속법의 당위성과 용이성

이상에서 논구한 바와 같이 맥진의 오장

정위에서 촌관척 배속법은 현대의 인식과 사고에 부합되지 않는다. 하지만 실상, 이 맥진 오장 定位에 대한 문제는 과거의 의가들에 의해서도 꾸준히 제기되었던 문제이다. 따라서 보다 빨리 해결점에 접근하기 위해서 그 의가들의 인식을 들여다볼 필요가 있다.

寸口脈診 이론의 시대적, 사변적 전개에 있어서 최초의 지점은 『素問·脈要精微論』이라고 할 수 있다. 『素問·脈要精微論』을 살펴보면 “尺內兩傍，則季脅也，尺外以候腎，尺裏以候腹。中附上左，外以候肝，內以候鬲；右，外以候胃，內以候脾。上附上右，外以候肺，內以候胸中；左，外以候心，內以候膻中。前以候前，後以候後。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，少腹腰股膝脛足中事也。”¹¹⁾라는 언급이 있다. 첫 문구에 나오는 “尺”은 黃帝內經에서 유일하게 나오는 촌관척 脈診의 언급이며, 당연하게도 이를 촌관척의 “尺脈”으로 본다는 인식이 촌관척 寸口診法의 장대한 시발점이라고 할 수 있다. 반면 楊上善은 『黃帝內經太素』에서 “마땅히 尺裏 이상의 皮膚로는 胸中の 病을 살핀다.”¹²⁾라고 하였고, 丹波元簡은 『素問識』에서 “분명 여기서의 尺은 팔 안쪽의 一尺이 되는 부분이며 결코 촌관척의 尺이 아니다. 寸口를 촌관척의 세 부분으로 나눈 것은 『難經』에서 시작되었다. 馬蒔와 張介賓 등의 여러 의가들이 촌관척의 尺으로 해석한 것은 『內經』의 뜻과 어긋난다.”¹³⁾라고 하여 “尺”은 “尺脈”이 아니라 “尺膚”를 뜻한다고 하였다.¹⁴⁾ 이는 『素問·脈要精微論』이 언급이 촌관척 寸口診法에 대한 原流가 되지 못한다고 말하는 것일 뿐 다른 대안을 제시하지는 못하였다. 하지만 朝鮮末 李圭駿의 견해는 잘못된 해석을 바로잡을 뿐 아니라 대안까지 제시해주고 있다.

李圭駿은 『素問大要』 「素問附設·脈解」에서 “尺者氣口之下位，言其深也。”라 하여 “尺”은 “深部”라고 하였다. 또한 “左右者，層數也”라고 하여 “左右”는 “上下”의 의미로 해석하고 “內外”를 각각 “浮部”와 “沈部”를 按하는 것으로 해석하고 脾胃를 제외하고 ‘外’에 藏을 배속시키고 ‘內’에 府를 배

속시킨 經文을 ‘內에 藏，外에 府’로 서로 바뀌어서 교정하였다.¹⁵⁾ 그리고 “『難經·二難』의 ‘從關至尺澤是尺內，從關至魚際是寸口。’는 脈을 짚는 방법이 輕重法과는 서로 모순되므로 王叔和가 『脈訣』을 作함에 이르러 經義를 어지럽게 한 것”이라 하여, 촌관척 기구맥진법을 인정하지 않았다. 이규준의 관점(輕重法)에서 『素問·脈要精微論』의 언급을 도표화하면 다음과 같다(그림 1, 표 2).




Figure 1. Lee Gyoojoon's illustration on the five stratum in the arterial pulse
李圭駿의 脈五層圖

Table 2. Understandings on *Maiyaojin gweilun* in *Suwen* by Lee Gyooj oon.

李圭駿의 『素問·脈要精微論』에 대한 인식

部位		配屬
上附上	右(上) 外	胸
	右(上) 內	肺
	左(下) 外	膻中
	左(下) 內	心
附上	右(上) 外	胃
	右(上) 內	脾
	左(下) 外	膈
	左(下) 內	肝
尺(=沈)	外	腹
	內(裏)	季脅(腎)

李圭駿의 脈五層圖(그림 1)는 그의 제자인 李元世(無爲堂)의 筆寫本 『素問大要』 말미에 기재된 것이다.¹⁰⁾

이규준 외에 宋代 王宗正도 맥진의 浮中沈 배속법을 주장하였는데, 『本草綱目·脈訣考證』에 王宗正이 “當從心肺俱浮, 腎肝俱沈, 脾在中州之說。 王叔和 獨守寸關尺分部位, 以測五臟六府之脈者非也。”¹⁶⁾라고 하였다고 기록되어 있다.

위에서도 언급되었듯이, 『難經』은 맥진의 촌관척 배속법뿐만 아니라 그와 모순되는 輕重法(浮中沈 배속법)에 대한 견해도 제시하였다. 「四難」에서 “脈有陰陽之法, 何謂也? 然, 呼出心與肺, 吸入腎與肝, 呼吸之間, 脾受穀味也, 其脈在中。 浮者陽也, 沈者陰也, 故曰陰陽也。 心肺俱浮, 何以別之? 然, 浮而大散者, 心也。 浮而短澁者, 肺也。 腎肝俱沈何以別之? 然, 牢而長者, 肝也。 按之濡, 舉指來實者, 腎也。 脾者中洲, 故其脈在中。 是陰陽之法也。”라 하였고, 「五難」에서 “脈有輕

重, 何謂也? 然, 初持脈, 如三菽之重, 與皮毛相得者, 肺部也。 如六菽之重, 與血脈相得者, 心部也。 如九菽之重, 與肌肉相得者, 脾部也。 如十二菽之重, 與筋平者, 肝部也。 按之至骨, 舉指來實者, 腎部也。 故曰輕重也。”¹⁷⁾라 하였으며, 이는 이규준의 脈五層圖와 그 뜻이 일맥상통한다고 할 수 있다. 『素問·脈要精微論』의 언급에서 “尺”이나 “左右”, “內外” 등을 무슨 의미로 받아들일 것인지의 문제는 문헌적, 문자적으로 그 시비를 가리는 것보다 현대의 인식과 사고체계에 부합하는 것이 무엇인지가 중요할 것이다.

이러한 이규준이나 왕종정의 인식은 『脈語』¹⁸⁾나 『脈學輯要』¹⁹⁾, 『醫宗金鑑』²⁰⁾ 등의 오장의 정상맥에 대한 언급과 연계되어 있으며, 이를 종합해보면, 肺脈이 皮毛와 相得한 부위로 가장 浮하면서 短澁하며, 心脈은 血脈과 相得하여 浮中沈하면서 大散하다. 脾脈은 肌肉과 相得하여 中 部位에 있으면서 緩大하고, 肝脈은 筋肉에 해당하므로 沈하면서 弦長하고, 腎脈은 骨에 닿는 곳까지 눌렀다 들면 實하게 오니 가장 沈하면서 細滑하다고 정리할 수 있겠다.²¹⁾

위와 같이 오장의 기능체계를 진단함에 있어 浮中沈 배속법으로 접근하는 방식은 맥진 뿐 아니라 按診에서도 찾아볼 수 있다. 『東醫寶鑑·火門』의 「辨五臟熱證」에 “身熱有五, 而其狀各異。 肝熱者, 按之肌肉之下至骨之上, 乃肝之熱也。 …… 心熱者, 微按至皮膚之下肌肉之上, 輕手乃得。 微按至皮毛之下則熱少, 加力按之, 則全不熱, 是熱在血脉也。 …… 脾熱者, 輕手捫之不熱, 重按至筋骨亦不熱, 不輕不重, 在輕手重手之間, 此熱在肌肉。 …… 肺熱者, 輕手乃得。 微按全無, 瞥然見於皮毛下, 日西尤甚, 乃皮毛之熱也。 …… 腎熱者, 輕按之不熱, 重按至骨其熱蒸手如火如灸。”²²⁾라고 하였는데, 이는 오장 각각의 熱證을 按診의 輕重에 따라 肺—心—脾—肝—腎의 순서로 파악할 수 있다는 인식이다.

또, 촌관척 배속법의 宗祖라고 할 수 있는 王叔和조차 『脈經』²³⁾에서 “脈來浮大者此爲

肺脈也，脈來沈滑堅如石腎脈也，脈來如弓弦者肝脈也，脈來疾去遲心脈也。脈來當見而不見爲病。病有淺深，但當知如何受邪。”라고 하였다. 비록 脾脈에 대한 언급은 없지만 脈의 淺深이 각 藏의 정상 상태와 관련이 있고 그 脈이 나타나지 않으면 질병 상태라고 인식한 것이다.⁹⁾ 이렇게 촌관척 배속법을 주로 사용하면서도 오장의 정상맥을 浮中沈 배속법으로 보려고 하는 인식은 관성적으로 현재 맥진법에 그대로 이어지고 있다.

3) 浮中沈 배속법의 활용 및 응용

한의 진단학에서는 촌관척 배속법이 주된 寸口脈診法이고 오장의 정상맥은 계절의 정상맥 정도로 소개하고 있을 뿐, 두 이론이 상충하는 부분을 인식하지 못하고 있는 실정이다. 이런 상황은 필자뿐 아니라 많은 한의사에게 맥진이 불명확하고 복잡하다는 인식을 가지게 만들었다. 필자는 20여년의 임상기간 동안, 맥진할 때 촌관척 배속법과 오장의 정상맥 개념을 같이 사용해왔다. 즉, 寸部位의 肺와 心の 맥은 浮取하고 關部位의 脾와 肝의 맥은 中取 혹은 中沈取하고 尺部位의 腎과 命門의 맥은 沈取하였다. 그러다 보니 寸部位의 脈이 沈脈으로 나타나거나 尺部位의 脈이 浮脈으로 나타나게 되면 病脈으로 인식하게 되는 모순이 생겼다. 또 좌우 촌관척 六部位에서 각각 28脈을 찾으려고 하기에 168가지나 되는 경우의 수를 탐색하려 함으로 실제 체득 및 이해가 매우 어렵게 되었다.

그러나 좌우와 촌관척의 脈은 실은 하나의 장기인 심장에서 분지되어 나온 혈관의 脈動이므로 六部位의 脈動은 동일한 상태일 수밖에 없다. 다만 병리적인 상태에서는 좌우의 脈動은 分別이 생길 수도 있다. 촌관척의 脈動은 생리적이거나 병리적인 상태, 모두 동일하지만 左手와 右手의 脈動은 氣血 순환이 원활하지 않은 상태(예, 痰飲證일 경우)에서는 차이가 생길 수도 있는 것이다. 이는 左血右氣의 관점으로 인해 다른 것이 아니라 인체

의 氣血이 순환함에 있어 순조롭지 않은 상태이기 때문에 左手와 右手의 脈動이 다른 것이다. 임상에서 手足麻木症이나 手足癱瘓症 등의 경우와 같은 脈絡이다.

따라서 정상적인 脈에서는 좌우 촌관척의 脈은 동일하며 그 脈은 “五層”으로 나타난다. 처음 가볍게 ‘三菽之重’으로 누르면 손가락에 느껴지는 느낌은 짧고 거칠게 나오게 되므로, 浮而短澁하다. 더 무겁게 ‘六菽之重’으로 누르면 손가락에 감촉되는 느낌은 더 커지면서 흩어지게 되므로, 浮而大散하다. 脈管의 가운데쯤에 해당되는 무게, ‘九菽之重’으로 누르면 손가락의 느낌은 크면서 느긋하게 되므로, 中而緩大하다. 脈管의 가운데에서 더 깊숙이 ‘十二菽之重’으로 누르면 손가락의 느낌은 길면서 팽팽하게 되므로, 沈而弦長하다. 그리고 至骨, 즉 脈動이 느껴지지 않은 깊이까지 눌렀다가 약간 떼면 가늘면서 뭉글뭉글 實하게 느껴지므로, 沈而細滑하다.

여기에서 간과해서는 안 되는 점은 胃氣脈, 眞藏脈의 관점이다. 맥진에서 胃氣나 神, 根이 존재하지 않으면 난치나 불치에 해당하는 眞藏脈이라고 한다.²⁴⁾ 여기에서 ‘胃氣’는 脈動의 和緩함이라고 하고, ‘神’은 脈動의 규칙성, ‘根’은 脈動의 根底의 힘이라고 규정하는데, ‘神’과 ‘根’의 속성은 不整脈(結脈, 代脈, 促脈 등)이거나 浮脈이나 芤脈 등 특수한 상황에서는 眞藏脈이 아니라 정상맥이거나 일반적 病脈일 가능성이 있다. 하지만 ‘胃氣’의 속성인 脈動의 和緩한 성질은 모든 脈(28脈)이 가지고 있어야 하며 그렇지 못할 때 진정한 眞藏脈이 된다. 이 脈動의 和緩함이 바로 脾脈의 正常脈(中而緩大)의 和緩함과 일맥상통한다. 이렇게 볼 때, 맥진의 복잡한 법칙을 떠나 생리적인 脈과 병리적인 脈, 극도의 병리적인 脈까지 쉽게 이해할 수 있고 임상에 적용할 수 있을 것이다.

한의학계에서 맥진에 의한 오장 배속법의 표준은 촌관척이다. 여러 한의학 원전에 제시되었고 현대의 많은 논문도 이를 따르고

있다. 그러나 浮中沈 배속법은 비록 소수의 의가들에 의해서 제시되었지만, 寸關尺 배속법에 비해 현대의 생리병리학적 인식과 사고에 잘 부합하는 것을 확인할 수 있다. 또한 실제 임상에서 적용함에 있어서도 보다 단순하며 용이하다고 할 수 있다. 본 연구에서 제시된 부중침 맥진방법을 다른 실험실 연구뿐만 아니라 실제 임상 사례에 적용한 후속연구가 이루어진다면, 맥진에 대한 많은 형이상학적인 의미를 들어내고 근거 중심의 의학으로 한걸음 다가갈 수 있을 것이다.

III. 결론

본 연구에서는 한의 임상에서 다용되고 있는 문헌인 『東醫寶鑑』에서 맥진이 기재된 醫案을 조사하여 그 중 촌관척 배속법에 따른 맥진 醫案의 비율을 조사하였고, 관련 의안을 고찰한 결과 다음과 같은 결과를 얻었다.

1. 맥진이 기록된 醫案을 『東醫寶鑑』에서 조사한 결과, 寸關尺 배속법은 전체의 9.2%에 해당된다.
2. 맥진에서 오장 정위에 대한 寸關尺 배속법보다는 浮中沈 배속법이 현대의 생리병리학적 인식과 사고에 부합하는 것으로 볼 수 있다.
3. 맥 觸診 부위는 脈動 감지가 가장 용이한 곳과 동일하므로 寸口의 원래 자리인 손목 뒤 高骨(요골의 경상돌기 근위부의 돌출 부위) 안쪽, 요골동맥이 통과하는 자리, 즉 촌관척의 關部位가 가장 적절한 부위이다.
4. 부중침 배속법에서 제시된 오장 정위 방법으로는 촌구맥 부위에서 가장 가볍게 누르면 맥의 넓이는 짧고(短) 거칠게(澁) 나오는 맥은 肺脈이며[肺脈浮而短澁], 중 부위에 못미치게 조금 무겁게 누르면 맥이 커지면서(大) 흩어지게(散) 나오는 맥은 心脈이며[心脈浮而大散(鉤 또는 洪)], 맥관의 중간 부위에까지 누르면 맥이 느긋해지면서(緩) 크게

(大) 나오는 맥이 脾脈이며[脾脈中而緩大], 가운데에서 더 깊숙이 누르면 팽팽해지면서(弦) 맥의 넓이가 길게(長) 되는 맥이 肝脈이며[肝脈沈而弦長], 맥동이 느껴지지 않는 깊이까지 눌렀다가 약간 떼면 가늘면서(細) 구슬이 지나가는 느낌(滑)이 나는 맥이 腎脈[腎脈沈而細滑]임을 나타내고 있다. 이와 같은 맥진 방법에 의하여 오장 정위를 적용할 수 있다.

5. 진장맥은 胃氣가 없는 상태로 난치와 불치의 상태를 나타내며, 위기는 和緩함 즉, 脾脈의 中而緩大와 상통한다.

현시점까지도 한의학계의 맥진 배속법의 표준은 촌관척이며, 이에 따르는 한의학 원전과 현대의 논문이 다수인 것이 사실이다. 하지만, 浮中沈 배속법은 寸關尺 배속법에 비해 현대의 생리병리학적 인식과 사고에 좀더 부합한다고 볼 수 있고, 임상 적용에 있어서도 단순하고 용이하게 적용할 수 있는 장점이 있다. 따라서 浮中沈 배속법에 대한 임상 활용 및 근거에 대한 후속연구가 이루어지기를 기대해본다.

IV. 참고문헌

1. “한의학”. Wikipedia. accessed June 18, <https://ko.wikipedia.org/wiki/한의학>.
“한의학”. 위키백과. 2021년 6월 18일 접속, <https://ko.wikipedia.org/wiki/한의학>.
2. Chidong Kim. A study on the concepts of Bowels and Viscera in *Huandineijing Suwen*. midterm thesis, graduate school of Kyungsan University. 1991, 18-19.
金治東. 黃帝內經(素問)에 나타나는 藏府概念에 關한 考察. 경산대학교 대학원 석사과정 중간발표 논문. 1991, 18-19.
3. Lim Han-je. A study on the reason that pulse-feeling method of meridians diagnosis flows into diagnostic method by taking pulse of setting six region for Chon (寸), Gwan (關) and Cheok (尺), i.e. the Chon spot pulse. Ph D. thesis, graduate school of Dongguk University. 2003, 35.
任韓帝. 經脈診斷의 脈診法이 氣口脈의 寸關尺 六部定位脈診法으로 演變된 緣由에 關한 研究 : 脈診法の 變遷 推移에 關한 研究. 동국대학교 대학원 학위논문. 2003, 35.
4. Qu Yueyun; the research group in 46th graduation preparation committee of college of Oriental Medicine, Kyunghee University. Reconsidering on Oriental Medicine. Seoul, 46th graduation preparation committee of college of Oriental Medicine, Kyunghee University, 1998, 255.
瞿岳云 편저, 경희대학교 46기 졸업준비위원회 학술부 역. 다시 생각해 보는 한의학. 서울, 경희대학교 한의과대학 졸업준비위원회, 1998, 255.
5. Hun-Pyeng Park. Review on medical texts in Joseon dynasty. The journal of Korean medical history. 2016; 29 (2): 1-16.
朴薰平. 조선시대 의학교과서 연구. 한국 의사학회지 2016; 29(2): 1-16.
6. Seoung-Mi Park. A study on the concept of the Right and Left in Oriental Medicine. Master degree thesis, graduate school of Kyunghee University. 1998, 21.
朴承美. 韓醫學의 左右理論에 關한 考察. 경희대학교 대학원 석사학위 논문. 1998, 21.
7. Song Beum-Young. A study on the Bon Shu Peon (本輸篇) of the Young Chu (靈樞). Master degree thesis, graduate school of Woosuk University. 1996, 62.
宋範龍. 靈樞 本輸篇에 對한 研究. 우석대학교 대학원 석사학위 논문. 1996, 62.
8. Nam MooKil. A comparative study on physiognomy and Hyungsang Medicine. Ph D. thesis, graduate school of Kyunghee University. 2010, 33-41.
南茂吉. 觀相學과 形象醫學의 比較研究. 경희대학교 대학원 박사학위 논문. 2010, 82-84.
9. Yang, Gun Il. A study on the pulse's division named Chon (寸) Kwan (關) Chuk (尺) by the Viscera and the Entrails and on the pulse of disease according to eum-yang (陰陽) of the Maek Kyung (脈經). Master degree thesis, graduate school of Wonkwang University. 2001, 6, 21-22.
양건일. 脈經·寸關尺 臟腑配屬과 陰陽病脈에 대한 研究. 원광대학교 대학원 석사학위 논문. 2001, 6(본 논문 15쪽에서 인용), 21-22(본 논문 18쪽에서 인용).
10. Hwang Won Duk, Kim Joong-Han. A

- study on the assignment of viscera of the pulsation examination method of ht KiGu. Journal of Korean Medical Classics. 1999; 12(1): 226-254. (cited from p.240 and p.249)
黃元德, 金重漢. 氣口脈診法の藏府配屬에 관한 研究. 대한한의학원전학회지. 1999; 12(1): 246-254.
11. Wonsik Hong. *Huangdineijing Suwen*, a sophisticate collation. Seoul, publishing department of the research institute of Oriental Medicine, 1985, 59.
洪元植 校合編纂. 精校黃帝內經素問. 서울, 東洋醫學研究院 出版部, 1985, 59.
12. Yang Shangshan; Li Keguang, Zhen g Xiaochang. *Huangdineijingtaishu*, collations and remarks. Beijing, People's Medical Publishing House company, 2005, 511.
楊上善 著. 李克光, 鄭孝昌 主編. 黃帝內經太素校注. 北京, 人民衛生出版社, 2005, 511.
13. Tanba Genkan. Somonshiki. Beijing, People's Medical Publishing House company, 1984, 112.
丹波元簡. 素問識. 北京, 人民衛生出版社, 1984, 112.
14. Yang Kwang-yeol. A study on the assignment of Jangbu (臟腑) to Chon·Gwan·Cheok (寸·關·尺) in Maekyojeongmiron (脈要精微論). Journal of Korean Medical Classics. 2009; 22(1): 27-34.
梁光烈. 『素問·脈要精微論』의 寸關尺 臟腑配屬에 대한 고찰. 대한한의학원전학회지. 2009; 22(1): 27-34.
15. Lee Gyoojoon. The main gists of *Huangdineijing Suwen* (42th book of the Great Collection of Korean Medical Classics). Seoul. Ryeongang book s, 1988, 315-316.
李圭峻. 黃帝內經素問大要(韓國醫學大系第42冊). 서울, 麗江出版社, 1988, 315-316.
16. Li Shizhen. critical research on *Mai jue* (in *Bencaowangmu*). Hongkong, The Commercial Press, 1930, 4.
李時珍. 脈訣考證(本草綱目 附篇). 香港, 商務印書館, 1930, 4.
17. Hua Shou; Yoon Chang-Yeol, Lee Nam Goo, Kim Seon Ho. A thorough translation of the *Fundamental meanings of Nanjing* with Korean postpositions. Daejeon, Jumin publishing company, 2003, 28.
滑壽 著, 尹暢烈, 李南九, 金善鎬 譯. 懸吐完譯 難經本義. 周珉出版社, 2003, 28.
18. Wu Kun; Guo Junshuang. Discourse on arterial pulse in the *Entire Books written by Wu Kun* Volume 6. Beijing, China Press of Traditional Chinese Medicine, 1999, 186.
吳崑 著, 郭君雙 主編. 吳崑醫學全書·第6卷·脈語. 北京. 中國中醫藥出版社, 1999, 186.
19. Tanba Genkan; Kyung Park, Heungje Kim, Jongho Kim. Combined edition of the *Collection of essentials in arterial pulse palpation* and the *Discourse on arterial pulse*. Seoul, Dae sung Culture publishing company, 1997, 33-34.
丹波元簡, 吳崑 著, 朴旻, 金興濟, 全鍾皓 譯. 譯釋 脈學輯要·脈語. 서울, 大星文化社, 1997, 33-34.
20. Wu Qian. Golden Mirror of Medicine. Beijing, People's Medical Publishing House company, 2011, 612.
吳謙. 醫宗金鑑. 北京, 人民衛生出版社, 2011, 612.

21. Dongguk Lim. Lectures on pulse diagnostics in the *Introduction to Medicine*. Paju, Mulgogisup publishing company, 2017, 75.
林東局. 의학입문 맥학강의. 파주, 물고기숲, 2017, 75.
22. Hur Jun. Miscellaneous disease in the *Treasured Mirror of Eastern Medicine*. Seoul, Daesung Culture publishing company, 1990, 388-389.
許浚 編著. 東醫寶鑑·雜病篇. 서울, 대성문화사, 1990, 388-389. (第3冊. 醫學發明 인용)
23. Wang Shuhe. Pulse Classic in the *Complete Records of Medical Division* Volume 3. Beijing, People's Medical Publishing House company, 1983, 86.
王叔和. 醫部全錄·第三冊·晉王叔和脈經. 北京, 人民衛生出版社, 1983, 86.
24. Compilation committee of *Practice in diagnostics of Korean Medicine*. Practice in diagnostics of Korean Medicine. Seoul, Goonja publishing incorporation, 2017, 92.
한의학진단학실습 편찬위원회. 한의학진단학실습. 서울, 군자출판사, 2017, 92.

별표 1. 『東醫寶鑑』(남산당, 1994)에 수록된, 寸關尺 配屬法 表記 없는 脈診 醫案

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 여부	출현 순번
身形	3	形이 充滿하고 脈이 堅大하면 順한 法이며 形이 充滿해도 脈이 작고 弱하면 氣가 衰한 法이니	1, 2		
	3	性이 急하면 脈이 또한 急하고 性이 緩하면 脈이 또한 緩하니 脈이 緩하고 遲한者は 壽함이 많고 脈이 急하고 數한 者は 夭함이 많다.	3~6		
	3	脈이 急數한者は 氣血이 消耗되고 神機가 停息하기 쉬운	7		
	3	脈이 遲緩한 者は 氣血이 和平하고 神機가 損傷하기 어려운	8		
精	18	男子가 脈이 微弱하고 澁하면 無子하니	9		
	18	滿脈은 精血의 不足한 證候가 된다. 丈夫의 脈이 滿하면 傷精이라고 한다. 又曰 滿은 精이 竭하고 血이 마른 脈이다.	10		
	18	微滿한 脈은 精을 傷한 것이다.	11		
	21	아침에 下氣가 많고 저녁에는 噎氣가 많으며 上旬 中旬에는 반드시 遺精하고 脈이 弦滑하고 크며 正午에는 洪大하였다.	12		
	22	脈이 極히 虛하고 芤하고 遲하면 清穀下利하고 亡血하며 失精한다.	13		
	22	한 사람이 虛로 因하여 精을 泄하고 脈이 弦大한데는	14		
	22	脈을 잡으면 空虛한 것을 脫精 또는 脫神이라고 하니	15		
氣	29	脈이 浮하고 脈이 구슬처럼 나는 것은 衛氣가 衰한 것이다.	16		
	29	寸口脈이 微하고 澁할 때, 微한 것은 衛氣가 衰한 것이며 澁한 것은 榮氣가 不足한 것이다.	17		
	29	寸口脈이 別별 떨어져 끊는 국의 고기점과 같은 것은 陽氣가 微弱한 症이며 얹혀서 거미줄과 같은 것은 陰氣가 衰한 症이다.	18		
	29	代한 것은 氣가 衰한 症이며 細한 것은 氣가 적은 症이요 浮하고 絶하는 것은 氣가 絶하려 하는 症이다.	19~21		
	29	손으로 눌러보아 脈이 沈하면 이것은 氣病임을 알아야 한다. 沈이 極하면 伏濇弱의 脈이 되니 難治다. 或沈滑하면 氣病에 痰飲을 兼한 症이다.	22		
	30	中風은 脈이 浮하고 몸이 溫하며 口에 痰涎이 많고 中氣는 脈이 沈하며 몸이 차고 口에 痰涎이 없다.	23, 24		
氣	32	夏脈은 心인데 心脈이 이르지 못하면 아래로 氣가 泄하는 것이 이것이다. …….	25	√	1
	32	寸口脈이 沈하면 胸中에서 短氣한다.	26		
	32	眞氣가 虛弱하여 脈이 弱하고 말할 힘이 없으면	27		

원명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
神	41	七情이 脈을 傷하니 기빠하면 脈이 散하고 怒하면 脈이 促(혹은激)하고 걱정하면 脈이 澁하고 생각하면 脈이 沈(혹은 結)하고 슬퍼하면 脈이 結(혹은 緊)하고 놀라면 脈이 顛(혹은動)하고 두려워하면 脈이 沈한다.	28~34		
	41	기쁨이 心을 傷하면 脈이 虛하고 생각이 脾를 傷하면 脈이 結하고 걱정이 肺를 傷하면 脈이 澁하고 怒가 肝을 傷하면 脈이 濡하고 두려움이 腎을 傷하면 脈이 沈하고 놀람이 膽을 傷하면 脈이 動하고 슬픔이 心包를 傷하면 脈이 緊한다. 대개 七情의 脈은 오직 氣口가 緊盛할 뿐이나 細分하면 이와같다.	35~42		
	41	脈搏이 大하고 滑하여 오래되면 스스로 그치고 脈이 小堅하면 急死하여 다스리지 못한다. 또 이르기를 癰疾의 脈이 虛하면 다스릴 수 있고 實하면 죽는다.	43~45		
	41	脈이 浮洪大하고 長滑大하며 堅實하면 痰이 쌓여서 心이 發狂한다. 또 이르기를 脈이 大堅疾하면 癰狂이다.	46		
	41	恍惚하고 癰狂한데 脈이 實하고 大하면 順한 것이요 沈하고 細하면逆한 것이다.	47, 48		
	41	대개 脈이 急함이甚하면 모두 癰狂과 厥疾이다.	49		
	41	心中이 驚悸하면 脈이 반드시 結代하고 飮食으로 말미암아 驚悸한 症은 沈하며 伏하고 動하며 滑한 것이다.	50, 51		
	41	寸口脈이 動하고 弱한데 動하는 것은 驚이 되고 弱한 것은 悸가 된다. 또 이르기를 肝脈이 動하기를 暴하게 하면 驚駭한 일이 있기 때문이다.	52, 53	√	2
	41	사람이 恐怖하면 ……., 脈의 形狀이 실을 둘러서 서려있는 것같고 얼굴빛이 회고 脫色이 된다.	54		
	41	사람이 부끄러워하면 ……., 脈이 浮하고 얼굴빛이 잠깐 회어졌다 붉어졌다 한다.	55		
	43	心驚 또는 膽懾이라고 하고 病이 心膽經에 있고 그 脈이 大하고 動하니	56		
	48	身熱이 나며 脈이 浮한 症은 陽病이니 妙香丸이 當劑요, 몸이 차갑고 脈이 沈한 症은陰病이니 五生丸을 써야 한다.	57, 58		
神	49	五生丸 ○陰病에 몸이 차고 脈이 가늘고 느린데 쓴다.	59		
	52	陰이 陽을 이기지 못하면 脈의 흐름이 薄하고 疾하여 狂症이發한다.	60		
	52	癰疾은 始發할 때에 意志가 즐겁지 못하고 直視하며 僵仆하며 그 脈은 三部와 陰陽이 전부 盛하다. 難經	61		
	54	六脈이 無力하며 皮膚가 氷石같았다. ……., 脈이 살아나며 治療되었다.	62		
血	54	脈이 모두 洪大하기가 거문고줄과 같은데 載人이 診斷하고	63		
	59	澁脈 濡脈 弱脈은 모두 亡血症이다.	64		
	59	失血에는 芤脈이 보인다. 脈이 沈細한 것을 貴히여기고 浮大한 것은 難治이다.	65, 66		
	59	芤脈은失血이고 澁脈은 少血이다. 또 吐血의 脈은 반드시 大하고 芤한다. 大脈은 發熱이요 芤脈은 失血이다.	67~70		
血	59	코피가 멎지 않고 脈이 大한 것은 逆症이다.	71		

14 임승일·박훈평·나창수

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	59	脈이 손가락을 끝을 들어받고코피가 나오며 몸에 熱한 者は 죽는다. 또 腹脹하고 血便이 보이는데 脈이 大하고 때때로 끊어지는 者は 죽는다.	72, 73		
	59	吐血 衄血하면 맥은 마땅히 沈細하는 것이 정상인 것인데 도리어 浮大하고 牢하는 者は 죽는다.	74, 75		
	59	奪血症에 脈이 實하면 難治이다.	76		
	59	吐血 衄血에 脈이 滑數하면 難治이다.	77		
	59	唾血에 脈이 小弱하면 살고 實大하면 죽는다.	78, 79		
	59	失血症에 脈이 大하고 數한 것은 逆證이다.	80		
	59	生地黃湯 ○蓄血證으로 脈이 沈細微하고	81		
	61	潮熱이 없으면 輕하고 潮熱이 있으면 重하며 潮熱이 盛하면서 脈이 크면죽는다.	82		
	61	心肺의 脈이 부수어져서 피가 샘솟듯이 입과 코로 나오면 治療하지 못한다.	83	√	3
	61	코피가 나와서 그치지 않고 脈이 大한 것을 逆證이라고	84		
	61	침과 小便으로 피가 나오고 肉脫이 되며 脈이 작고 勁한 것을 逆證이라고	85		
	血 61	嘔血하고 가슴이 빠근하여 등까지 당기고 脈이 작고 빠른 것을 逆證이라고	86		
	61	배가 부르고 血便이 나오며 脈이 大하면서 때때로 끊어지는 것을 逆證이라고	87		
	61	가래와 小便으로 피가 섞여 나오고 肉脫이 되며 脈이 손가락끝에 들어받는 것을 逆證이라고	88		
	61	모든 血이 보이는 證에 身熱이 나고 脈이 大하면 難治하니	89		
	61	몸이 차고 脈이 靜한 症은 易治인데	90		
	61	吐血하고 咳逆하며 上氣되며 脈이 삭하고熱이 있는데 눕지 못하면 죽는다.	91		
	62	血脫한 症은 顔色이 희고 칙칙하여 潤澤하지 않고 그 脈이 空虛하다.	92		
	62	安臥하여서 脈이 盛한 症을 脫血이라 한다.	93		
	62	六脈이 弦細하고 齒한데눌러보아서 空虛하면 顔色이 반드시 蒼白하고 칙칙하여 윤택하지 못한 것은 脫血이니	94		
	62	三黃補血湯 ○六脈이 虛하고 芤하며 衄血 吐血하는 것을 다스린다.	95		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	64	吐血 …… 만일 脈이 緊하고 數하면 難治가 된다.	96		
	64	薄厥症 入門曰 어떤 사람이 평소에 아무런 病도 없었는데 갑자기 半斗의 피를 吐하는데 脈이 弦急하였다.	97		
	69	故로 便血이 된다. 그脈이 虛하고 澁한것이 이것이다.	98		
	72	血暈은 모두가 失血이 過多함으로 인하여 虛하여 어지럼증이 일어나고 脈이 微 澁하니	99		
	73	만약에 脈이 洪實하고痛이甚한 症은	100		
	73	保命生地黄散 脈이 微하고몸이 涼하면 桂皮를 加한다.	101		
夢	77	少陰症에 脈이 微細하고다만 자려고 하는데	102		
夢	77	혹은 熱病에 땀을 낸 뒤에 脈이 沈細하고	103		
	79	脈의 상태는 肝臟이 邪를 받은 症이니 心病이 아니다.	104	√	4
	79	兩手の 脈이 함께 緩하니이것은	105		
	79	밥을 잘 먹고 脈이 平함을 얻었는데	106		
言語	86	말하지 못하고 渴해서 물만 마시고 脈이 數한데	107		
	87	寸口脈이 微하고 澁한데 微한 症은 衛氣가 不足한 症이며 澁한 症은 榮氣가 없는 症이니	108		
	87	心の 脈搏이 堅하고 長하면 반드시 痛症이 생기고 혀가 말려서 말하지 못한다.	109	√	5
	87	○ 心脈이 濡함이 甚하면瘡이 되고 手少陰의 別脈을 通理라고 하는데	110	√	6
	87	眞氣가 虛弱하고 脈이 가늘며말이 게으른 것은	111		
津液	90	尺이 澁하고 脈이 滑하면 땀이 많다. 註釋에 가로되 尺膚가 澁하고 尺脈이 滑함	112		
	90	脈이 大하고 虛하고 浮하고 濡하면 땀이 난다.	113		
	90	汗脈은 浮虛하고 或은 澁하며 或은 濡, 軟, 散, 洪大하니 渴하여 飲함에	114		
	90	男子 平人の 脈이 虛弱, 微細한 것은 자주 盜汗이 난다.	115		
	90	傷寒에 脈이 浮하고 遲하며 얼굴에 熱이 나면서 붉고 …… 脈이 遲한 것은 陽氣가 없는 것이니	116, 117		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	95	傷寒에 脈이 浮洪하며 땀이 기름 같고 털이潤하며 喘息이 그치지 않은 症은	118		
	96	半병어리가 되는데 脈이 洪大하므로	119		
痰 飲	99	胸中에 留飲이 있으면 短氣하고 渴하며 四肢歷節이 疼痛하고 脈이 沈細하다.	120		
	99	留飲症은 四肢歷節이 아프고 短氣하고 脈이 沈하니	121		
	99	脈이 數하고 괴롭고 眩暈하면 이것은 支陰이 胸中에 있는 때문이니	122		
	104	支飲은 혈떡거리고 눕지 못하며 거기에 短氣를 兼한 症이니 그 脈이 平하다	123		
104		脈이雙으로 弦한 症은 寒飲이요 偏하게 弦한 症은 飲이다.○肺飲은 脈이 弦하지 않고다만 喘促하고 短氣하며 脈이 沈하고 弦寒症은 懸飲이니 內痛이 있고○脈이 浮하며 細滑한 症은 飲에 傷한 症이다.○脈이 偏弦한 症은 飲이 되고 或은 沈 弦 滑을 兼하며 或은 結하고 或은 伏한 症은痰飲이 關節에 的된 症이다.	124~129		
104		痰脈은 弦滑하다 하였고 ○三因에는 飲脈은 다 弦 微 沈 滑하다 하였으니 ○脈의 沈 弦 細 滑과 大小의 不均한 것이 다 痰飲症에 屬한다. ○滯脈은 調理만 虛費하는 것인데 ……., 대개 痰이 阿膠처럼 굳어지면 脈道가 막히고 澁한 때문이다.	130~134		
104		脈이 크고心下에 留飲이 있으면 등이 寒冷해서 물과 같다.	135		
105		肌色이 如常하며 脈이 滑하여 고르지 못하고 定하지 못한 것이 그 特徵이다.	136		
106		手足이 寒冷하여 癱痺하고 昏倒하며 脈이 沈細한 症이다.	137		
107		半夏溫肺湯 ……., 胃가 虛冷한 症이며 그 脈이 沈弦細遲하다	138		
108		脈이 浮하면 吐해야 한다.	139		
五臟六腑	114	脈이 잦으면病이 腑에 있고 더디면臟에 있으며 잦으면 몸이 덥고 더디면 몸이 차다.	140, 141		
肝臟	117	大腿가 부서지며 살이 빠지면 눈꺼풀이 꺼지고 眞藏脈이 나타나	142		
心臟	120	배꼽위가 跳動하며脈이 弦하는데 이것이 모두 心臟이 傷한 所致	143		
120		안으로 아프고 어깨와 목이 당기면 한달만에 죽고 眞藏脈이 나타나면	144		
脾臟	124	脾의 臟脈이 나타난 症이니 300일내에 죽는다	145		
肺臟	127	그脈이 緊하고 浮하며 數하면 吐血한다	146		
127		濁唾와 涎沫이 나오고 寸口脈이 數한 것이 그 症勢이다	147		
127		가슴이 隱隱하게 아프며 脈이 滑數하면 肺癰이 된다	148		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
肺臟	127	만일 眞藏脈이 나타나면 死의 期日을 定한 것과 같으니	149		
腎臟	130	動作이 빠르지 못하며 眞藏脈이 때때로 나타나면	150		
	131	小便이 清利하고 脈이 沈遲하면 冷氣가 腎으로 들어간다.	151		
	131	小便이 赤澀하고 脈이 沈數하면 熱氣가 命門으로 들어가는 것이니	152		
	131	脈이 浮하고 洪하며 脈이 기름같고 숨을 헐떡거리며	153		
胃	135	胃脈이 實하면 脈氣가 있고 胃脈이 虛하면 泄瀉한다.	154, 155	√	7, 8
胞	144	脈이 微하면 氣血이 俱虛하므로	156		
	144	少陰脈이 微하면 精이 없고 遲하면 陰中이 차고 澀하면 月血이 不來하니	157	√	9~11
	144	하루 數升 정도 下血하는데 脈이 急疾하면 죽고 遲하면 산다.	158~161		
	144	漏下가 멎지않을 때 脈이 작고 虛滑하면 살고 크고 緊하고 實하고 數하면죽는	162, 163		
	144	脈이 오는데 거문고줄과 같으면 小腹이 아프고 月水가 不利하고 孔竅에 瘡이	164		
	144	帶下의 脈은 마땅히 遲滑하여야 되는 法이니 浮虛하면 못 쓴다.	165, 166		
	149	白帶下가 섞여 있으며 脈이 沈細 疾數하고 或은 沈弦 洪大하니	167		
	152	帶下症에 脈이 浮하고 惡寒하고 漏下하면 難治이다	168		
	155	그 脈은 沈하고 緊한데이것은 寒氣가 血室에 들어가서	169		
蟲	159	脈이 沈하고 浮하면 寸白蟲이요	170		
	159	諸蟲의 脈이 沈하고 實하면 살고 虛하고 크면죽는다.	171, 172		
	159	蟲脈이 宣當 沈弱하고 弦해야하는데 도리어 洪大하면곧 蛔蟲이 甚한 症을	173, 174		
蟲	159	勞瘵의 脈이 數하거나 或은 澀하고 細한데다 潮汗과 咳血과 肉脫이 甚하면	175		
	159	陰肛을 蟲蝕하는데 脈이 虛小한者は 살고 勁急한者	176, 177		
	161	六脈이 다 細하면 蟲脈이 아니다.	178		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
小便	169	少陰脈이 數하면 婦人은 陰中에 瘡이 나고 男子는 氣淋이 생긴다.	179		
	169	腎脈이 滑하고 實하면 癰瘡가 된다.	180	√	12, 13
	169	便血하면 芤하고 數하면赤黃하며 實脈이 癰閉함으로써 熱이 膀胱에 있다.	181, 182		
	169	淋脈이 盛大하고 實하면살고 虛細하고 澁하면 難治이다.	183, 184		
	169	癰病에 脈이 가늘면다스리기 어렵다.	185		
	169	淋病에 脈이 細하고 數하면해롭지 않고	186		
	169	少陰脈이 澁하면 氣가 膀胱을 닫으니 女人이 그러하면 陰中에 瘡이 나고 大하고 實하면낮기가 쉬우며 虛하고 澁하면 難治다.	187~189	√	14~16
	170	여자의 房勞후 小便이 不通하고 脈이 沈細한데 猪腎半隻을 넣어	190		
	172	兩手の 脈이 濡한 듯했으나 거듭 만져보니弦한지라 이것은 걱정으로 因해서 얻은 症이다. 濡은 血少 氣多한데서 온 症이요 弦은 飲이 있어서 그러한 症이니	191		
	173	蓼朮飲 얼굴이 여윈데다가 脈은 왼쪽은 좀 和하나 오른쪽이 澁했다. …… 轉脬가 되고 脈이 가늘고 氣가 弱하며 胎가 膀胱의 下口를 눌렀는데	192		
	174	줄지에 吐逆하고 大小便이 不通하며 煩悶하고 四肢가 떨리며 脈이 없는데 …… 大便이 점점 通하고 脈이 和해지며	193		
	177	猪脬湯 脈을 보니 虛가甚하기에 峻補를 할	194		
	182	그 脈을 만져 보니 輕할 때엔 濡하고 重할 때엔 弦하며 얼굴이 여위고	195		
小便	183	四妙固眞丹 小便이 黃濁하고脈이 脾部는 洪數하고 腎部는 微澁하고	196	√	17
	186	小便이 後竅로 나오며 六脈이 다 沈澁하므로	197	√	18
大便	190	泄瀉가 脈이 緩하고 때로 작고結한 症은 살고 浮大하고 數한 症은 難治다	198, 199		
	190	泄瀉에 脈이 洪大하면 逆이 된다.	200		
	190	泄瀉하고 脫血이 되며 脈이 實하면 難治다.	201		
	190	泄瀉脈이 沈한것으로 風에 傷하면 浮하고寒에 傷하면 沈細하고 暑에 傷하면 沈微하고 濕에 上하면 沈緩하다	202~206		
	190	泄瀉脈이 원제로 沈한것인데 沈遲한 것은 寒이 侵入한 症이요 沈數한것은 火熱한 症이요沈虛한 것은 滑脫한 症이요 濡濕은 緩弱하니 夏月에 많이 있다	207~210		
	190	膿血이 내리는데 脈이 沈小하며 留連하면 살고 數疾하고또 有熱한 症은 難治	211, 212		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	190	下痢脈이 微弱하면서 數한 症은 스스로 나오려 하는 症이니	213		
	190	下痢脈이 大하면 낫지 않는다	214		
	190	下痢를 하루 十餘回를 하고 脈이 도리어 實하면 難治다	215		
	190	下痢脈이 작고 가늘어야 하고 洪大하면안된다.	216, 217		
	190	下痢脈이 微小한症은 곧 낫는 症이요 크고 浮洪한症은 날을 期約하지 못한다.	218, 219		
	190	脈은 마땅히 滑大할것이요 浮하고 弦急하면 죽고 沈細한症은 害가 없다.	220~222		
	190	痢疾에 몸이 서늘하고 脈이 가늘면살고 몸이 熱하고 脈이 크면 難治다	223, 224		
	190	下痢脈이 微小하면 枯하고 浮洪하면 難治다	225, 226		
	190	燥結한 脈이 沈伏한 法이니 熱結한 것은 沈數하고 虛結한 것은 沈遲하다고 疑心해서는 안된다.	227, 228		
	190	老人 虛人の 閉結에 脈이 雀啄하면 難治다.	229		
	191	몸이 차고 渴하지 않으며 脈이 微細하면서 더딘것은 다 寒症이다.	230		
	192	萬病五苓散……. 腹痛하지는 않고 배가 우는 것이 우뢰와 같고 脈이 細한 데 쓴다	231		
	193	얼굴에 때가 끼고 脈이 虛하고 煩渴하고 自汗하는데	232		
	194	小便이 赤澁하여 煩渴하고 脈이 數하니	233		
	194	水穀이 消化되지 않고 脈이 微弱한데	234		
	194	腸胃가 虛滑해서 禁하지 못하고 脈이 沈細한데	235		
	196	防風芍藥湯 飧泄에 身熱하고 脈弦하며 腹痛하고 渴한데 쓴다	236		
	196	痰泄에 脈이 沈滑하면	237		
	196	泄瀉하면 痛이 減하고 脈이 弦하고 滑한데	238		
	196	瀉하고 나면 곧 너그러워지고 脈이 가는 症인데	239		
大便	198	氣가 펴이지도 않고 脈이 微하고 嘔吐하는 것 等症은 寒泄에 屬하니	240		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	199	漿水散 暴泄로 因하여 一身이 冷汗하고 脈이 沈弱하고 氣少하여	241		
	199	朝眞丹 泄瀉가 그치지 않고 腸鳴 腹痛하고 手足厥冷하며 脈이 微弱한 데 쓴다	242		
	199	下痢가 그치지 않고 脈이 沈遲하고 手足이 厥逆하며	243		
	202	만일 惡寒하고 脈이 沈하고 혹은 허리가 아프고 臍下가 아파도 …… 만일 惡寒하고 脈이 沈하며 血을 먼저 내리고 膿을 뒤에 내리면	244		
	202	黃芩芍藥湯 下痢膿血하고 身熱 腹痛하며 脈이 洪數한 것을 다스린다	245		
	206	五虛단 症은 脈이 細한 症, 皮膚가 차가운 症, 氣가 적은 症, 前後를 泄利하는 症, 飲食이 들어가지 않는 症	246		
	207	이러한 症이 있으면 色이 赤白과 脈의 大小를 莫論하고 通利를 시키는	247		
	210	久病에 몸이 차고 脈이 沈小한 데는 덥게 해주고 暴病에 몸이 뜨겁고 脈이 뜨며 洪한 症은 맑혀 주어야 한다.	248, 249		
大 使	210	下痢에 脈이 도리어 滑한 症은 속에 반드시 除去해야 할 症이니	250		
	210	脈이 弦한 症은 風을 除去해야 하니	251		
	212	飧泄에 脈이 크고 手足이 차가우면 難治요 脈이 작고 手足이 溫하면 易治이다	252, 253		
	212	渴하며 脈이 弱한 症과 脈이 잣고 微熱이 있으며 땀이 나는 症은 다 自愈한다.	254		
	212	下痢에 脈이 크면 難治다.	255		
	212	下痢가 생선의 골같은 症과 身熱하고 脈大한 症은	256		
	212	下痢에 手足이 厥冷하고 脈이 없으면 灸해야 되니 灸해서 따뜻하지 않고 脈이 돌아오지 않으며 도리어 숨을 헐떡거리면 難治다.	257		
	212	下痢에 脈이 끊어지고 手足이 厥冷한데 땀만에 脈이 돌아오고 手足이 溫하면 살고 脈이 돌아오지 않으면 難治다.	258		
	212	배가 울고 가득하며 四肢가 맑고 泄하며 脈이 크면 이것은 逆이니	259		
	212	땀이 그치지 않으며 脈이 없고 自利를 금하지 못하며 몸이 熱하고 脈이 實한 症은 다 難治다.	260		
	212	泄瀉가 오래 그치지 않고 手足이 차며 脈이 虛脫하고 煩燥하며 脇脅을 찌르며	261		
	212	痢疾의 難治症은 脈大 身熱 鴨屎 發渴 咳逆 五色 噤口 紅水 唇紅 手足冷 氣喘 等症	262		
	213	脈이 浮하고 數하여 能食하고 大便을 하지 않으면 實한 症으로서	263		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	213	脈이 沈하고 더디며 먹지 못하며 身體가 무겁고 大便이 硬塞한 症을 陰結	264		
	213	老虛한 사람이 大便이 燥秘하고 脈이 浮한 症은 氣에 있으니 ……., 脈이 沈한 症은 魄에 있으니	265, 266		
頭	226	만약 頭痛 眼痛하고 脈이 急하고 短 瀦하면 죽는다.	1		
	226	○頭痛에 脈이 浮滑하면 낫기 쉽고 短瀦하면 낫지 않는다.	2, 3		
頭	226	○頭痛에 短瀦하면 죽음이 곧 이르고 浮滑한 症은 風痰이니 다스리기 쉬운	4, 5		
	226	○陽脈이 弦하면 頭痛을 의심할 바 없다.	6	√	1
	226	○肝脈이 溢하고 大하면 반드시 眩暈하니 豫防하여야 한다.	7	√	2
	226	○寸口脈中이 短한 症은 頭痛이 있는 까닭이다.	8		
	226	○寸口脈이 緊急하거나 혹은 浮하거나 短하고 혹은 弦한 症은 다 頭痛을 주관	9		
	226	○頭痛에 陽이 弦하고 부하면 風이고 緊하면 寒이고 風熱은 洪數하며 濕症은 細堅하고 氣虛頭痛은 비록 弦하나 반드시 瀦하고 痰厥은 滑하고 腎厥은 堅實하다.	10~16		
	226	眩暈의 張本이 되며 風은 浮하고 寒은 緊하고 濕은 細하며 暑는 虛하고 生涎은 弦하며 滑하다. 虛脈은 脈象이 없는 듯한 것이다.	17~21		
	226	○腎厥頭痛은 그 脈이 들면 弦하고 누르면 緊하다.	22		
	226	○頭痛에 左手脈이 數한症은 熱이요 脈이 瀦한 症은 死血이 있는 症이며 右手脈이 實한 症은 痰積이 있는 경우요 脈이 大한 症은 病이 오래된 까닭이다.	23~26		
	232	玉眞丸 ……., 脈이 들면 弦하고 누르면 돌같이堅한 症은 腎氣가 不足하여	27		
	234	太陽頭痛은 風寒을 싫어하고 脈이 浮하고 緊하니	28		
	234	○少陽頭痛은 寒熱이 往來하며 脈이 弦하고 細하니	29		
	234	○陽明頭痛은 自汗하고 發熱하며 脈이 緩하고 길고 實하니	30		
	234	○太陰頭痛은 반드시 痰이 있고 몸이 무겁고 脈이 沈하며 緩하니	31		
	234	○少陰頭痛은 ……., 발이 차갑고 氣가 逆하여 寒厥이 되며 脈이 沈하고 細하니	32		
	234	○厥陰頭痛은 或은 痰沫을 吐하며 厥冷하고 脈이 浮하고 緩하니	33		
	237	脈이 動하고 머리가 무겁고 痛하며 熱氣가 往來하는 症	34		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
面	240	面熱로 괴로와 하나 脈이 洪大하는힘이 있으면	35		
	240	寸口脈이 微하고 澁할 때 微한 症은 衛氣가 衰 …… 澁한 症은 營血이 不足한 症	36		
	242	加味消毒飲 …… 눈에 連하여 항아리 한쪽을 올려 놓은처럼 부었는데 그 脈이 洪大	37		
眼	267	눈이 赤痛하고 脈이 實하며 大便이 秘한데	38		
耳	281	귀가 먹고 脈이 크면 살고 沈細하면 難治이다.	39, 40		
	281	腎脈이 浮하고 盛하면 風이요 洪하고 實하면熱이요 細하고 澁하면 虛이다.	41~43	√	3~5
	281	○귀병에 腎이 虛하면 遲濡하다. 그 脈이 浮大하면 風이요 洪動하면 火賊이요 沈澁하면 氣凝이고 數하고 實하면 熱이 閉塞한 것이다.	44~48		
口舌	296	口舌에 瘡이 나는 것은 脈이 洪하며 疾하고 速한데 만약 脈이 虛하면 中氣 不足	49, 50		
咽喉	323	반드시 下痢하며 脈이 微弱한데 古方에 腎傷寒이라	51		
頸項	330	움직이면 微痛하고 脈이 弦數實하였다	52		
	332	腎脈이 緩한 症이甚하면 脊이 구부러진다.	53	√	6
	332	寸口脈이 손가락에 닿는 것이 促하고 上擊하면 肩背痛이라고 한다.	54		
	332	○脈이 大하면 心下에 留飲이 있으며 등이 寒冷하다.	55		
	332	○등에 惡寒이甚한 者가 脈이 浮大하고 힘이 없으면이것은 陽이 虛한	56		
背	333	가을의 脈이 太過하면 逆氣가 되고 신경질나게 背痛한다.	57		
	333	診脈을 하여보니 弦하고 삭한데 무겁게 누르니 豁大하고 왼쪽이 오른쪽보다 컸	58		
	334	어느 사람이 등이 僵僂하고 발이 痙攣하며 脈이 沈弦하고 細한데	59		
胸	335	陽脈은 微하고 陰脈이 弦하면 胸痺하고 疼痛한다. 陽脈이 微한 것은 病이 上焦에 있음을 알 수 있고 陰脈이 弦한 것은 胸痺와 心痛이 있는 것을 알 수 있다.	60		
胸	335	心腹痛에 沈細한脈이 보이는 것은 마땅하고 浮大한 脈은 마땅치 않다.	61, 62		
	335	○心腹痛에 脈이 沈細해야 하고 浮大하고 弦長한것은 忌한다.	63, 64		
	335	○心腹痛에 脈이 沈細한 것은 좋으나 浮大하고 弦長한 것은 死脈이다.	65, 66		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	335	胸痞에 脈이 滑하면 痰이 있고 結하고 弦하고 伏하면 역시 痞하고 澁脈은 氣가 劣한 症이다.	67~69		
	335	○心痛에 左手脈이 數하면 熱이 많고 瀼하면 死血이 있다. 右手脈이 緊하고 實하면 痰積이고 脈이 大하면 반드시 久病이다. 兩手の 脈이 堅實하고 大便을 보지 못하면 可히 下할수 있다. 痛이 甚하면 脈이 반드시 伏하다.	70~75		
	335	心脈이 약간 急하면 痛하고 약간 大하면心痺하고 등이 牽引하여 疼痛하며 短하고 數하거나 或은 瀼하면心痛이다	76~78	√	7~9
	336	臍上이 跳動하며 그 脈이 弦하니	79		
	336	痛이 甚하여 煩躁하고 脈이 洪大하니	80		
	336	心痛에 脈이 澁한症은 死血이 있는 症	81		
	342	痛이 甚하면 脈이 반드시 伏하니	82		
	343	心痛에 脈이 堅實하고 大便을 하지 못하는 症은	83		
	345	寒痞는 渴하지 않고 脈이 더디니 …… 熱痺는 煩渴하고 脈이 數하니	84, 85		
	348	結胸에 脈이 浮大한 症을 下하면 안되니	86		
	348	結胸症에 陰脈이 나타나고 陰症이면서	87		
乳	353	瘡頂이 陷下하여 검은 눈과 같으며 脈이 弦洪한데 누르면 細小하게	88		
腹	357	脈이 細小하고 緊急하면 刺痛하며 陰弦하면 腹痛하고 弦急하면 小腹이 痛하며	89~91	√	10
	357	心腹痛에 숨을 쉬지 못하고 脈이 細小하며 더딘 症은 살고 크고 빠른 症은 難治이며 腹痛에 脈이 도리어 浮大하고 길면難治다.	92~94		
	357	心腹痛에 脈이 沈細한 症은 좋고 浮大弦長한 症은 나쁘다	95, 96		
腹	357	寒氣가 厥陰의 脈에 머무르면 血이 澁하고 脈이 急한	97		
	357	脈이 弦한症은 溫散해야 한다	98		
	357	대개 腹痛에 脈이 滑한 症은	99		
	360	脈이 壯實한症과 또는 처음 腹痛이 發한 症은	100		
	361	脈이 弦하고 氣가 傷한 症은 …… 脈이 洪하고 金을 傷한 症은 …… 脈이 緩하고 水를 傷한 症은 …… 脈이 瀼하고 血을 傷한 症은 …… 脈이 遲하고 火를 傷한 症은	101~105		
腰	365	눌러서 뼈까지 이르러도 脈氣가 적은 症은 腰脊이 疼痛하고 몸에 痺氣가 있	106		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	365	○腰痛의 脈이 모두 沈弦한 것이니 沈弦하면서 緊한 症은 寒이요 沈弦하면서 浮한 症은 風이요 沈弦하면서 濡細한 것은 濕이요 沈弦하면서 實한 것은 挫閃	107~110		
	365	沈하고 弦하다. 沈한것은 滯가 되고 弦한것은 虛가 되며 澁한것은 瘀血이고 緩한 것은 濕이며 滑한 것 伏한 것은痰이 되고 大한 것은腎虛한 것이다.	111~116		
	365	脈이 大한것은 腎虛腰痛이다.	117		
	366	杜冲丸 …… 脈이 大하고 虛하며 疼痛이 그치지 않는데	118		
	366	脈이 滑한 것 伏한 것은 痰飲痛이다	119		
	368	熱을 보면 減하며 寒을 만나면 發하며 脈이 沈弦急한데	120		
	368	○脈이 緩하고 或은 沈하면 濕腰痛이다	121		
脇	371	寸口脈이 弦한 症은 즉 脇下가 拘急해서 疼痛하는 症이니	122		
	371	脈이 雙으로 弦한 症은 肝氣가 남음이 있고 兩脇이 作痛한다.	123		
	371	肝脈이 沈하고 急하며 浮해도 또한 上症과 같은 症이 나타난다.	124	√	11
	371	肝脈이 搏하며 堅하고 詰며色이 푸르지 않은 症은 墜墮한데 病든 症이요	125	√	12
	371	肝脈이 軟하고 散하며 그 色이 潤澤한 症은 溢飲이 있으니	126	√	13
脇	371	氣鬱하고 胸脇이 疼痛한데 그 脈이 沈澁하면 鬱로 다스려야	127		
	373	氣가 弱한 사람은 脇下가 잘 疼痛하고 脈이 弦細하니	128		
	373	症勢는 陽脈이 弦하고 陰脈이 澁한데 대개 여러 가지 香料와 薑桂의 屬을 쓰니 病이 더욱 甚해 …… 脈이 弦한 症은 痛이요 澁한 症은 腎邪가 남음이 있는 症	129	√	14
	375	脈이 浮하고 大한데 浮한 症은 風이 虛한 症이요 大한 症은 氣가 強한 症이며	130		
皮	375	斑疹의 脈은 陽은 浮하고 數하며 陰은 實하고 大하며 火가 盛하면 表이다. …….	131		
	375	上症의 脈은 沈과 伏이 많고 或은 細하고 散하며 或은 끊어지고 없는 수도 있다	132, 133	√	15
	375	發斑이란 症은 血이 皮膚에 흩어지는 症이므로 脈이 伏한다.	134		
	375	脈이 浮하고 緩한 症은 濕에…… 緊하고 浮한 症은 寒에…… 澁하고 芤한 症은 死血	135, 136		
	375	여름의 脈은 心에 屬하니 夏脈이 太過하면	137		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	378	만일 陰脈이 나타나고 黑斑이 稠密하고	138	√	16
肉	385	얼굴이 여위고 脈이 크며胸中에 氣가 많으면 難治	139		
脈	392	止代脈이 나타나면 炙甘草湯 人蔘黃芪湯을 ……脈이 虛하고 軟하면 茯神湯 補氣湯	140, 141		
	392	炙甘草湯 傷寒의 脈이 結代하고 心이 動悸하는 症	142		
	392	人蔘黃芪湯 血脈이 通行케하고 雜病의 代脈을 다스린다	143		
	392	茯神湯 六脈이 虛軟하고 咳嗽하면 心臟이 아프며	144		
	392	補氣湯 氣虛하고 脈이 浮하고 軟하며 怔忡 無時한 等症	145		
脈	392	甘草 脈이 結代하고 心이 動悸하는데 甘草灸 1兩 水 3升到 달여서	146		
	393	石膏 脈이 數한것을 除去한다. 病은 물러갔으나 脈이 數한데 煎服	147		
手	401	上行하여 脾를 치고 脈이 沈細한 것이다	148		
	401	消痰茯苓丸 …… 痛處가 때때로 옮기고 脈이 沈細한데 쓴다	149		
	402	四肢의 歷節이 疼痛하고 氣가 短하고 脈이 沈하며 오래되면	150		
足	404	脚氣의 脈은 ……浮 弦은 風이 ……濡 弱은 濕이 ……遲 濡은 寒이 ……洪 數은 熱鬱한 症	151~154		
	404	脈이 微 滑한 症은 虛한 症이오 牢 堅한 것은 實한 症이다.	155, 156		
	404	脚氣脈이 浮한 症은 風이…… 緊한 症은 寒이…… 緩細한 症은 濕이…… 洪數한 症은 熱	157~160		
	404	沈하면서 弦한 症은 風이…… 沈하면서 緊한 症은 寒이…… 沈細한 症은 濕이…… 沈數한 症은 熱이 되는	161~164		
	404	脾脈이 甚히 緩하면 痿厥이 된다.	165	√	17
	404	痿脈은 浮하고 大하다 痿와 蹻을…… 脈이 虛하면 살고 緊急하고 빠르면 죽는다	166~168		
	404	寒厥의 脈은 沈한 것이니 數하고 實하면 熱이 되는 것이다.	169		
	404	한 환자를 다스리는데 脚 膝 尻 臂이 모두 冷하나 脈이 沈數하고 힘이 있으니	170		
	409	脈이 促短하고 數하며 嘔吐해서 그치지 않는 症은 죽는다	171		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	409	上氣하고 脈이 數하고늡지 못하면 또한 죽는다	172		
	409	脚氣에 脈이 浮大하고 緊結한 症은 가장 惡한 것…… 細하면서 結하여도 역시 惡脈	173, 174		
	410	故로 痿病은 그 脈이 반드시 浮大하다	175		
	413	診察하니 그 脈이 沈數하고 有力하였다	176		
足	414	氣가 急하며 脈이 잠깐 컸다가 잠깐 적었다하는 症은	177		
毛髮	418	脈이 弦하고 氣가 弱하며 皮毛가 焦枯한데	178		
	418	毛髮이 脫落하여 1莖도 남지 않았는데 脈이 微弦하고 濡하니	179		
前陰	422	滑한 脈을 모두 疝으로 看做하였다	180		
	422	○ 心脈이 搏이 滑 急하면 心疝이 되고 肺脈이 沈搏하면 肺疝이 되고 腎脈과 肝脈이 大急沈하면 모두 疝이 된다.	181~183	√	18~20
	422	肝脈의 滑한 것이 甚하면 癰疝이 되고 心脈이 微하고 滑하면 心疝이 되고 腎 肝脈이 滑한것이 甚하면 癰癰가 된다	184~186	√	21~23
	422	腎脈이 甚히 크면陰痿가 된다. 脈이 急하면 疝瘕가 되니 小腹이 疼痛한다.	187, 188	√	24~26
	422	三陽이 急하면 瘕가 되고 三陰이 急하면 疝이 된	189, 190		
	422	腎脈 肝脈 心脈이 다 小하고 急하며 鼓하지 않으면 모두 瘕가 되는 것이다	191	√	27
	422	疝의 脈이 弦 急하면 積聚가 속에 있는…… 牢하고 急하면 살고 弱하고 急하면 죽고 沈遲 浮 濡한 것은 疝 瘕…… 痛이 甚하면 或 伏하고 或 細하고 或 動한다	192~196		
	422	寸口脈이 弦하고 緊해서 弦 緊이 서로 攻搏하면 寒疝이 되는 것이다.	197		
	422	婦人의 少陰脈이 滑하고 數한 것은 陰孔가운데 瘕이 난 것이요 少陰脈이 浮하고 動할경우 浮하면 虛가 되고 動하면 痛이 되며 婦人이면 陰이 脫下한다	198, 199	√	28, 29
	422	疝瘕와 積聚의 脈이 弦急한 것은 살고 虛弱하고 작으면 難治다	200, 201		
	424	그 脈이 甚히 沈緊하지 않고 滑大해서 힘이 없는 것이	202		
	431	還少丹 下部脈이 微細하고 陰痿不起하는 데	203	√	30
	432	兩手脈이 가늘고 弱한데 斷定하기를 秋脈인데	204		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
後陰	441	蟲이 肛門을 먹는데 그 脈이 虛小하면 살고 緊急한症은 죽는다	205, 206		
後陰	441	○ 무릇 痔脈이 沈小하고 實한 症은 易治요 浮 洪하고 軟弱한症은 難治다	207, 208		
	441	○ 便血하면 衄하다. 數하면 赤 黃하며 實脈이면 癰閉하니 熱이 膀胱에 있는	209~211		
	443	만일 脈이 洪大하면 四物湯에 黃連解毒湯을 合하여	212		
審病	470	形이 盛하고 脈이 細하고 少氣하여 숨쉬기가 거북하…… 形이 瘦하고 脈이 크고	1, 2		
	471	脈이 작고 弱하며 澁한것은 久病이요 脈이 滑하고 浮하고 疾한 것은 新病	3, 4		
	471	脈이 작아도 色이 黧앗기지 않으면…… 脈은 黧앗기지 않아도 色을 黧앗기면	5, 6		
	471	脈이 弱하나 滑한것은 胃氣가 있는 것이니 易治	7		
	471	脈이 實하고 堅한 症을 病이 더욱 甚	8		
	471	脈이 四時를 逆하는 症을 治療하지 못한다고 하니	9		
	472	脈이 잠깐 성기다가 잠깐 잦고 잠깐 더디고 잠깐 빠른 症은 四季(辰戌丑未)를 따라서	10		
	472	脈이 浮하고 洪하며 몸에 기름과 같은 땀이 나고	11		
辨證	474	脈이 盛한 것, 皮가 熱한 것……. 脈이 細한 것, 皮가 寒한 것…….	12, 13		
	474	그 脈이 堅하고 大한 故로 實하게 되니	14		
	476	風은 脈을 浮하게 하고 寒은 脈을 急하게 하…….	15, 16		
	476	脈이 實하면 血이 實하고 脈이 虛하면 血이 虛한 것	17		
	476	脈이 盛한데 血이 적은 것이 …… 脈이 적은데 血이 많은 것이 ……	18		
	478	大熱病에 氣가 熱하고 脈이 滿한 것을 重實이라 하고 脈이 虛하고 氣가 虛하고	19, 20		
	478	脈의 虛實이란 濡한 것이 虛가 되고 緊하고 牢한 것이 實이 되며	21, 22		
辨證	478	脈이 이르러서 從하는데 按하면 鼓動하지 않으니 …… 脈이 이르러서 按하면 鼓動이 甚하고 盛 …… 脈이 數한데 按하면 鼓動하지 않는 것 …… 다 찬데 按하면 脈氣가 23~26 손가락 밑에서 鼓擊하여 盛 ……	23~26		
	478	얼굴이 붉고 脈이 沈하며 微한 것은 …… 小便이 붉고 脈이 沈하고 滑한 症은	27, 28		

원명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	479	寸口脈은 微하고 濇한데 微-衛氣가 運行하지 않는…… 濇-榮氣가 미치지 못한 것	29		
	479	脈은 있는데 氣가 없는 症은 口厥…… 氣가 있는데 脈이 없는 症은 行尸	30		
	481	熱病은 脈이 고요하다가땀을 내면 脈이 盛하고燥한 症이 一逆이요	31		
	481	泄瀉에 脈이 洪大한 症이 二逆이요	32		
	481	몸이 熱하고 脈이 偏하게 끊어지는 症이 三逆이요	33		
	481	寒熱이 形을 뺏고 脈이 堅搏한症이 五逆	34		
	481	…… 몸이 熱하며 脈이 큰 症이 …… 四肢가 清泄하고 脈이 큰 症이 ……衄血이 나고 脈이 큰 症이 …… 脫形하고 脈이 작고 輕한 症이…… 身熱하고 脈이 작고 빠른 症이……	35~39		
	481	血便이 나오며 脈이 크고 때로 끊어지는 症이…… 形肉이 脫落하고 脈이搏한 症이…… 등을 牽引하고 脈이 작으며 빠른 症이…… 殮泄하며 脈이 끊어지는 것이	40~43		
診脈	482	太陰이 있는 곳에 그 脈이 沈하고 少陰이 있는 곳에 그 脈이 鉤하며 厥陰이 있는 곳에 그 脈이 弦하고 太陽이 있는 곳에 그 脈이 크고 길며 陽明이 있는 곳에 그 脈이 短하고 澁하며 少陽이 있는 곳에 그 脈이 大하고 浮하니	44~49		
	483	上部에 脈이 있고 下部에 脈이 없으면 ……上部에 脈이 없고 下部에 脈이 있으면	50, 51	√	1, 2
	484	傷寒脈이 結하고 代하여 心이 動하고 驚悸하는 것은	52		
	485	寸口脈이 平해도 죽는 것은 生氣가 홀로 안에서 끊어진 症	53		
	485	病이 熱하고 脈이 數한데 按해서 動하지 않는 것은	54		
	485	患者가 혹 脈이 없는 것은 病處에 痛이甚하여 脈이 반드시 潛伏하는 것이요 만일 痛症도 없이 脈이 오지 않는 것은 죽는 症	55, 56		
	485	한 손만 脈이 없는 症을 …… 두 손에 다 脈이 없는 症을	57		
	486	脈이란……. 길면 氣가 다스려진…… 짧으면 氣가 病든…… 數하면 心이 傾거…… 大하면 病이 더한…… 위가 盛하면 氣가 높고 아래가 盛하면 氣가 脈하며 大하면 氣가 衰하고 細하면 氣가 少하며 濇하면 心이 痛한 症이다.	58~66		
診脈	486	粗하고 大한 것은 陰이 不足하고 陽이 有餘한 症이니 熱中이 된다.	67		
	486	風熱에 脈이 靜하면 泄瀉하고 血이 脫하며 脈이 實하면 病이 안에 있고 脈이 虛하면 病이 밖에 있고 脈이 沈하고 堅하면 難治한 症이다.	68~71		
	486	寸口脈이 沈하고 堅한 것은 病이 가운데 있고 浮하고 盛한 것은 病이 밖에 있는 것이며 脈이 盛하고 滑하면서 堅한 것은 病이 밖에 있고 小하고 實하면서 堅한 것은 病이 안에 있다.	72~75		
	486	寸口脈이 微하면 陽이 亡하고 濡하면 血이 亡하며 緊하면 寒이 되고 浮하면 風이 되며 數하면 熱이 되고 動하면 痛이 된다.	76~81		
	486	風은 脈이 浮虛하고 寒은 堅牢하며 沈潛한 것은 水蓄이요 急弦한 것은 支飲이요 動하면 痛이 되고 數하면 熱煩한 法이다.	82~86		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	486	脈이 크고堅한것은 血氣가 함께 實한 것이요 작은 것은 血氣가 함께 虛한 것이요 큰 것은 血氣가 함께 많은 것이요 細微한것도 血氣가 역시 함께 虛한 것	87~90		
	486	寸口脈이 ……것은 陽氣가 微한 것이니 浮하되 無力한 것 ……것은 陰氣가 衰한 것이니 細하고 無力한 것 ……綿綿해서 漆絲와 같아서 때로 끊어지는 것은 血이 亡한……	91~93		
	486	寸口脈이 微하고 濡한데 …… 衛氣가 不足한 것이요 …… 營血이 不足한 것이며 滑한 것은 血은 많은데 氣가 적고 濡한 것은 血이 적고 氣가 많은 것이다.	94~96		
	486	緊한 것은 傷寒으로…… 虛한 것은 傷暑로…… 濡한 것은 傷燥로…… 細하고 緩한 것은 傷濕으로…… 浮한 것은 風에…… 弱한 것은 火에 傷한 症이다.	97~102		
	487	一呼에 四動 以上하는 것은 死脈	103		
	487	脈이 往來하지 않으면 죽는다. 肥人의 脈이 가늘고 작아서 실과 같으면서 끊어지려 하는 것은 …… 瘦人의 脈이 躁하면 …… 모든 浮脈이 뿌리가 없으면 죽는다.	104~107		
	487	脈이 四損하면 3日만에 죽으니…….	108		
	487	환자가 脈이 끊어지고 입이 벌어지며 발이 腫脹하면 五日만에 죽는다	109		
用藥	491	그 脈이 緊하고 數하며 按하면 鼓動하지 않고 空虛하니 ……	110		
	491	그 脈이 沈하고 細한데 按하면 洪大하니 이것은 밖으로는 虛寒이	111		
吐	501	上部에는 脈이 있고 下部에는 脈이 없으면 마땅히 吐해야	112	√	3
	502	肥白하고 氣虛한 사람 脈이 虛軟하고 無力한 者는……	113		
風	509	혹은 六脈이 浮滑하고 虛軟하는 等 症이 나타나면	114		
	512	中風의 脈이 큰 것은熱이 아니며 風脈이다	115		
	512	寸口脈이 浮하고 緊한데 緊하면 寒이 되고 浮하면 虛가 되며	116		
	512	中風에 입을 다물었는데 脈이 遲하고 浮하면 吉하고 急 實 大 數하면 ……	117		
	512	中風에 脈이 遲하고 浮하면 다스리는 것…… 大하고 數해서 極하면 다스리지 못……	118, 119		
	512	中風에 脈이 浮하고 滑하며 兼하여 痰氣가 있으면서 或은 沈滑하면 風으로 다스리지 말 것이며 或浮 或沈하고 微하면서 虛한 것은 危殆함을 잘 부지하고……	120~122		
	512	大法에 脈이 浮하고 遲하면 吉하고 疾하고 急하면 凶한 것이다.	123, 124		
	512	脈이 浮하고 遲하면 다스리기가 쉽고 大하고 數해서 極하면 죽는다	125, 126		
	512	脈이 浮하고 大한것은 風이다. 脈이 浮하고 數하면 中風이다.	127, 128		
	512	表證이 있으면서 脈이 浮하고 風寒을 싫어하며	129		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	512	小續命湯 무릇 中風에 六脈이 浮하고 緊하며 風氣가 盛하고	130		
	516	中風으로 말하지 못하고 脈이 沈하고 口噤하는데	131		
	516	中風에 脈이 沈하고口噤한 것은	132		
	523	三生飮 卒中風에 痰塞하고 昏倒해서 人事를 不省하고 脈이 沈하고 熱이 없는 者	133		
	537	瘧脈은 누르면 緊하기가 활줄의 곧은 것과 같고 위 아래로 運行한다	134		
	537	瘧脈은 다 伏하고 沈하며 弦하고 緊하다	135		
	537	瘧脈은 弦直하고 或은 沈細한데 조금 脈을 내어 풀고자하면 ……弦緊한 것은 오히려 可하거니와 伏 堅한 것은 안된다.	136, 137		
風	537	浮하고 無力한 것은 太陽……길고 有力한 것은 陽明……浮하고 弦小한 것은 少陽	138~140		
	537	무릇 瘧脈이 비내리는 것과 같이 흐르고 흩어져서 손가락밖으로 나가는 것은 ……	141		
	537	몸이 冷하고 手足도 冷하고 脈이 沈細하면	142		
	537	몸이 熱하고 咳嗽하고 痰이 나오고 脈이 活數하면	143		
寒	540	寒熱이 傷寒과 비슷한데 단 脈이 沈遲弦細하고	144		
	543	或은 傷寒에風脈이 나타나고 또는 傷風에 寒脈이 나타나고	145, 146		
	545	緊脈이 傷寒이 된다. 傷寒의 脈이 陰陽이 함께 盛하고 緊하고 濇하다.	147, 148		
	545	脈이 盛하고 몸이 찬 것은 傷寒에서 …… 弦하고 緊한 것이 寒脈이 된다	149, 150		
	545	傷寒의 脈이 大 浮 數 動 滑하면 陽…… 沈 濇 弱 弦 微하면 陰인…… 陰病에 陽脈이 보이는 것은 살고 陽病에 陰脈이 보이는 것은 죽는다.	151, 152		
	545	熱病에는 脈이 浮하고 洪하는 것이 원칙인데 細하고 小하면 藥…… 功力만 허비	153, 154		
	545	脈을 낸 뒤에는 脈이 靜하고 病이…… 喘하고 熱하고 脈이 亂하면 ……	155, 156		
	545	寒이 太陽을 傷-脈이 浮하고 濇한…… 傳變하면 脈狀을 이름하기 어렵다.	157		
	545	陽明- 長…… 少陽- 弦…… 太陰- 遲 沈…… 少陰- 緊…… 厥陰 熱甚- 伏하고 厥冷	158~162		
	545	表解하고 裏病은 남아 있으면 그 脈이 堅하고 實한것이다.	163		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	545	脈이 緊하고 澁한것은 寒이요 陽은 浮하고 滑하며 陰은 濡하고 弱하니	164	√	4
	545	陽脈은 濡하고 弱하며 陰脈은 小하고 急하니 이것은 風寒이 아니요 즉 濕溫脈	165	√	5
	543	陽脈은 浮하고 滑하며 陰脈은 濡하고 弱한 것인데 혹 風을 만나면 變해서 風溫	166	√	6
	543	陽脈은 洪하고 數하며 陰脈은 實하고 大한 것인데 溫熱을 만나면 變해서 溫毒	167	√	7
	543	陽脉이 濡弱하고 陰脉이 弦緊하고 다시 濕氣를 만나면 變해서 濕溫이 된다.	168	√	8
寒	543	熱에 病들기를 極하게 하면 가볍게 누르면 滑하고 무겁게 누르면 散하고 澁하다	169		
	543	中寒에 緊하고 澁하며 陰陽이 함께 盛하면 法에는 脈이 없는 것인데	170		
	543	傷寒의 熱病에 脈이 마땅히 洪 大해야 되는 것인데沈 細한 것은 忌한다.	171, 172		
	543	中寒의 脈은 虛하고 微細하다	173		
	547	처음 病을 받을 때에 脈浮하고 無汗할 때 …… 脈緩하고 有汗할 때	174, 175		
	547	發熱하고 惡寒하고 脈浮한 것은	176		
	548	太陽傷風은 脈이 陽으로는 浮하고 陰으로는 弱하게 되니	177	√	9
	548	脈이 浮緊하고 惡寒하고 發熱하며 身痛하고 脈이 나지 않으며	178		
	548	脈이 浮緊한 것은 傷寒脈이니 …… 脈이 浮緩한 것은 傷風脈이 되니	179, 180		
	548	脈이 微弱한 것은 陽이 없는 것 ……熱多寒少하며 脈이 微하고 惡寒하면	181, 182		
	548	表證이 그냥 있고 脈이 微하고 沈하면서…… 모두 있으면서 脈이 도리어 沈하고	181~184		
	548	九味羌活湯 …… 骨節이 아프고 發熱 惡寒하며 脈이 없고 脈이 浮緊한데	185		
	549	大靑龍湯 …… 傷風의 證候이고 脈이 浮緊한 것은 傷寒脈……	186		
	549	傷寒의 證候이고 脈이 浮緩한 것은 傷風脈이 되니 ……	187		
	549	傷風에 寒脈이 나타나며 傷寒에 風脈이 나타나는 것을……	188		
	549	桂婢各半湯 太陽病에 脈이 微하고몸이 가렵지 않은 症	189		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	549	桂麻各半湯 太陽病에 脈이 가늘고몸이 가려운 症	190		
	550	脈이 浮하고 數하며 먹기는 잘 하…… 脈이 沈하고 遲하여 먹지 못하고	191, 192		
寒	550	喘息하며 直視하는데 脈이 弦하면 살고 澹하면 죽는다	193, 194		
	550	服用한 후에 脈이 弦하면 살고 澹하면 죽는다	195, 196		
	550	다만 脈弦하면 살고 脈澹하면 죽으니	197, 198		
	550	手足이 溫하며 脈이 洪數하고 謔語하는 症은	199		
	550	發狂하고 어디로든지 달아나려 하며 脈이 虛數한데	200		
	550	살이 실룩거리며 떠는 症을 兼하고 脈이 代하기에 ……症이 그치고 脈이 和하고	201		
	550	汗을 다스린 뒤에 脈이 洪大하고 煩渴한 것	202		
	550	大渴하고 脈이 洪大한 症	203		
	550	풀리지 않고 脈이 浮한 症은	204		
	551	上焦가 熱하면 脈이 浮하고 發熱하며	205		
	551	白虎湯 陽明病에 땀이 많고 煩渴하며 脈이 洪大한데	206		
	551	猪苓湯 陽明症에 小便이 不利하며 땀이 적고 脈이 浮하고 渴한 症	207		
	552	傷寒의 脈이 弦細하며 頭痛하고 發熱하는 症	208		
	552	일찌기 吐下하지 않았는데 脈이 沈緊한 症	209		
	552	술이 푸르고 手足이 冷하며 脈이 沈細하면	210		
	553	傷寒에는 陽脈이 濇하고 陰脈은 弦한 症	211	√	10
	554	少陰이 病들면 脈이 微細하고 다만 자려고	212		
	554	도리어 發熱하고 脈이 沈하면…… 手足이 차며 骨節이 아리고 脈이 沈하면……	213, 214		
寒	554	下痢하고 脈이 沈遲하며 얼굴이 조금 붉고	215		
	554	下痢하고 脈이 끊어지거나 或은 脈이 없으면…… 手足이 厥逆하며 脈이 작고 끊어지려고	216~218		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
		하는데…… 풀리지 않고 脈이 가늘어서 끊어지고자 하는 症……			
	554	下痢하고 脈이 가늘어서 …… 厥逆하며 脈이 없고 乾嘔逆하고 煩悶하면 …… 脈이 暴出하면 죽고 조금씩 계속하면 사는 것이다.	219, 220		
	555	厥冷하고 脈이 가늘어서 끊어질듯하고 或은 脈이 伏하니	221		
	555	旬月後에 發하면 脈이 다시 微弱하며	222		
	555	少陰病에 脈이 沈細數하면	223		
	555	麻黃附子細辛湯 少陰病에 다만 자려고하고 發熱하며 脈이 沈한症	224		
	555	附子湯 少陰病에 脈이 沈하고 手足이 차며	225		
	556	四逆湯 傷寒陰症의 要藥이며 또 三陰에 脈이 더디고몸이 아픈데	226	√	11
	556	通脈四逆湯 …… 厥冷하며 脈이 가늘어서 끊어질 것같거나 或은 脈이 없는 症	227		
	556	白通湯 少陰病에 下痢하고 脈이 나는 症을	228		
	557	厥陰에 傳하여 脈이 微緩하고 微浮한 것은	229		
	558	囊이 오므라지며 脈이 가늘어서 끊어질 듯하는 症	230		
	558	當歸四逆湯 厥陰症에 手足이 厥冷하고 脈이 가늘어서 끊어질 듯한 症	231		
	558	…… 만약 脈이 크면 症勢와 더불어 …… 脈이 도리어 가늘어서 症勢와 더불어	232		
	558	陽症이 陰과 비슷한 것은 大便이 검고 脈이 滑하다.	233		
	558	陽症으로 身熱 頭痛하고 脈이 浮數하면	234		
寒	558	만일 무겁게 눌러서 無力하거나 或은 脈이 없으면 …… 만약 脈이 有力한 症은	235		
	558	陰證이 陽證과 비슷한 症은 얼굴이 붉고 脈이 가늘다	236		
	559	身體가 疼痛하고 脈이 浮한 症은	237		
	560	麻黃杏仁飲 …… 頭痛하며 衄이 없으면서 脈이 浮하고 緊한 症	238		
	562	發熱하고 脈이 弦細하고 頭痛하는 症	239		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	562	가령 脈이 浮하고 大하면 …… 大便이 硬하며 脈이 沈數하면 …… 表는 或은 脈浮하고 或은 頭痛하며 …… 厥逆하고 脈이 滑하면 裏에 熱이 있는 症	240~243		
	562	身體가 疼痛하는데 있어 脈浮하고 發熱하고 …… 脈沈하고 自利하고	244, 245		
	563	四肢가 逆冷하고 脈이 沈微하면서 數하지 않고	246		
	563	四肢가 厥冷하고 脈이 沈遲해서 누르면 힘이 없는 症	247		
	563	그 脈이 비록 伏하였으나 누르면 滑한 症	248		
	563	대개 熱厥에 脈이 沈伏하고 滑한症은	249		
	563	爪甲이 푸르고 脈이 沈疾한데눌러서 힘이 있으면	250		
	563	熱厥에 脈이 沈伏하며 滑하고 頭上에 땀이 있고	251		
	564	陰陽의 二厥은 脈이 다 沈…… 陰厥은 脈이 沈 遲 弱…… 陽厥은 脈이 沈 伏 滑	252, 253		
	564	7-8일만에 脈이 微하고 皮膚가 冷하고	254		
	565	外腎이 얼음처럼 차며 脈이 뼈에 붙여서 取하면 있으나 약간 누르면 없으니	255		
	565	얼굴이 검푸르고 六脈이 沈細하여 一息에 七至하니	256		
	565	六脈을 뼈에 붙여서 取하면 있으나 약간 누르면 없고 一息에 八至以上이 되고 或은 헤아리지 못할 정도로 노니	257		
寒	565	그 脈이 드디어 沈하나 滑하여 證은 비록 陰이나 陽脈이 있으므로	258		
	565	返陰丹 陰毒에 脈이 伏한 症과 陽이 脫하여 脈이 없는 것	259		
	566	復陰丹 陰毒에 얼굴이 푸르고 四肢가 차고 脈이 沈한 症	260		
	566	回陽救急湯 傷寒의 陰症과 陰毒에 四肢가 厥冷하고 脈이 沈細하고	261		
	566	熨臍法 陰毒이 危急하고 몸이 차며 脈이 없고 氣息이 끊어지려 하고	262		
	566	下痢하며 六脈이 洪大하는 症을 陽毒發斑이라	263		
	566	六脈이 洪大하고 有力하며 燥渴하는데	264		
	566	黑奴丸 陽毒에 發斑하고 煩躁하고 大渴하며 脈이 洪數한 症	265		
	567	三黃石膏湯 …… 달음질치고 헛소리를 치며 六脈이 洪大한 症	266		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	567	陽毒升麻湯 …… 狂言하며 或은 鬼神이 보이고 脈이 浮大數한 症	267		
	567	大便이 自利하고 緊으며 六脈이 沈하고 細하면서 빠르고 或은 없기도한다	268		
	567	病人이 몸이 冷하고 脈이 沈細하면서 빠르고煩躁하면서	269		
	567	몸이 熱하나 脈이 鼓擊하지 않으며 或은……	270		
	567	傷寒에 六脈이 沈伏하며 보이지 않고 깊이 눌러서 뼈에 이르면 힘이 있는 것	271		
	568	體가 厥冷하고 脈이 滑數하여 누르면 손가락 밑에서 鼓擊하니	272		
	568	脈이 數하고 몸이 도리어 모두 차면	273		
	568	양치만하고 삼키지 않으며 脈이 반드시 沈細하고 힘이 없으니	274		
	568	氣色이 光潤하며 脈이 반드시 沈滑하고 힘이 있으니	275		
寒	568	病人의 脈이 가늘고 澁한 症은 亡血로	276		
	568	脈이 浮하고 緊하고 …… 脈이 浮하고 數하고 …… 脈이 浮하고 澁하며 …… 脈이 浮하고 滑하며 …… 脈이 浮하고 弦하며 ……	277~281		
	568	少陰病에 下痢하고 脈이 沈하고 遲하며	282		
	568	傷寒 6-7일에 만약 脈이 和平하고煩燥가甚하고	283		
	568	傷寒에 脈이 浮하고 自汗이 나며	284		
	568	脈이 結하고 代하며 心이 動悸한 症	285		
	574	…… 脈이 浮한 症은 …… 脈이 洪大한 症 ……	286, 287		
	574	脈이 浮하고 渴하는 症은 太陽에	288		
	574	약간 혈떡거리고 直視하는데 脈이 弦하면 살고 濇하면難治다	289		
	575	發狂에 陽症에 陽脈이 보이는 症은 …… 陰症에 陰脈이 보이고 ……	290, 291		
	575	手足이 冷하며 脈이 細微하면 …… 手足이 溫하며 脈이 洪數하면	292, 293		
	576	傷寒에 脈이 浮하고 緊한데 …… 大便이 實하고 脈이 沈實하며 有力하면 …… 누르면	284~286		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
		아프고 脈이 浮滑하니 ……			
	578	表症이 그대로 머물러 있어 脈이 微하고 沈한데	287		
	578	脈이 없거나 或은 微해지는 것을 두려워하기 때문이다. 만약 脈이 浮하고 緊하며 몸이 疼痛하고 ……., 만약 脈이 微하여 땀을 내지 못하면	288, 289		
	578	太陽病에 脈이 浮하고 緊하며 發熱하고	290		
	579	몸이 아프고 脈이 沈하며 大便이 自利하고 ……몸이 熱하며 脈이 잦고 煩渴하여	291, 292		
	580	다시 熱하며 脈이 躁하고 疾한데	293		
寒	580	땀이 나고 脈이 오히려 躁 盛한 症은 …… 發汗한 뒤에 脈이 躁하고 疾하며	294, 295		
	581	身形이 비록 和하나 脈이 약간 微數하니	296		
	584	만약 熱이 除하고 脈이 더디며몸이 서늘하고	297		
	585	傷寒에 兩手が 다 脈이 없는 症 ……., 一手에 脈이 없는 症을	298, 299		
	585	人事를 不省하고 脈이 고요하거나 或은 脈이 없는症	300		
	585	喘促하고 脈이 없는 症은 …… 陰이 躁하고 脈이 없는 症은 …… 下痢하고 脈이 이르지 않는 症은 …… 脈이 맺힌 症은 …… 兩手に 脈이 없는 症	301~305		
	585	脈이 따라서 돌아오면 살고 服藥해도 여전히 땀이 없고 脈이 돌아오지 않으면……	306, 307		
	585	五味子湯 傷寒에 喘促하며 脈이 伏하고 厥하는 症	308		
	585	熱이 풀리지 않고 脈이 아직 浮한症	309		
	587	脈이 浮한 症은 마땅히 發汗을 해야 하며 ……裏症이 있고 脈이 沈한 症은 下해야	310, 311		
	587	脈이 浮하고 數하면서 微하고 몸이 溫和한 症 ……脈이 浮해서 풀리는 症은 축축하게 땀이 나고 풀리면 잘 먹는데 脈이 浮하지 않고 풀리는 症은 반드시 大汗이	312, 313		
	587	6-7일만에 脈이 이르는 症	314		
	587	脈이 浮한 故로 땀이 나고 풀려지는…… 脈이 平和하면서 크게 煩하고…… 脈이 浮하고 數하면서 微하고 몸이 溫和	315~317		
	587	脈이 浮하고 또 緊한데 누르면 도리어 扪하는 症은 …… 脈이 浮하고 數한데 눌러서 扪하지 않는 症은	318, 319		
	587	그 脈이 微하니 이것은 일찌기 發汗을 지나서	320		
	588	傷寒에 寸口脈이 浮하고 緊할 때에	321		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	588	脈이 뜨지 않으면 땀내지 못하고 脈이 微弱하고 或은 尺脈이 더디면 ……	322, 323		
	588	脈이 急緊하며 곧게보고 눈을 감지 못하며	324		
寒	589	脈이 마땅히 浮하고 緊한 症에 도리어 浮하고 遲하면 遲한 症은 亡陽이 된 症	325, 326		
	589	太陽病에 脈이 浮하고 緊하며 몸이 疼痛하면 ……가령 尺脈이 더디면 …… 안되는 症	327		
	590	謔語하고 脈이 沈하면서 滑한 症	328		
	590	반드시 脈이 浮하고 頭痛하며 惡風 惡寒하는	329		
	590	만약 脈이 浮緊한데 쓰면 반드시 結胸이 되고 ……脈이 緩한데 쓰면 반드시 痞氣	330, 331		
	590	脈浮,虛症,惡寒症,嘔吐하는 症과 轉矢氣症이 없는 症 ……脈이 沈實하지 않은 症	332, 333		
	590	눈이 붉고 煩渴하며 脈이 7-8至하는데 ……	334		
	590	脈이 微하며 氣가 虛하고 힘이 弱하면	335		
	591	몸이 冷하고 脈이 微하며	336		
	591	脈의 陰陽이 함께 虛하고 熱이 그치지 않는 症은 …… 脈의 陰陽이 함께 盛하고	337, 338		
	591	下痢한 뒤에 脈이 끊어지고手足이 厥冷하다가 간혹 脈이 돌아와서手足이 溫하면 살고 돌아오지 않으면죽으며	339, 340		
	591	다시 熱하고 脈이 煩躁 …… 厥逆하며 脈이 없는데 灸해도 脈이 돌아오지 않고	341, 342		
	591	熱病에 脈이 躁하고 盛하면서 땀이 나지 않는 症	343		
	591	문득 昏昧하고 脈이 없으면서 藥을 먹은 뒤에 땀이 나고 和解하면 살며 땀이 없고 脈이 이르지 않는 症은 죽으며	344		
	591	傷寒에 脈이 잠깐 잦고 잠깐 성근 症은 不治요 脈이 大한 症은 不治며	345, 346		
	592	厥逆하고 脈이 없으며 陰囊이 오므라지니	347		
	592	만일 脈이 돌아오지 않고 手足이 따스하지 않으면	348		
寒	593	葱熨法 中寒에 몸이 冷하고 脈이 가늘고 얼굴이 靑黑한 症	349		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	594	防風冲和湯 …… 頭痛하고 身熱하며 自汗하고 惡寒하며 脈이 浮緩한 症	350		
	594	몸이 아프고 다리가 저리고 脈이 浮虛해서 힘이 없는 症	351		
	595	六脈이 虛하고 微하여 거의 없는 것 같은데	352		
	596	金液丹 久寒과 痼冷 및 吐利를 오래하여 몸이 차고 脈이 微한데	353		
	596	至聖來復丹 …… 臟腑가 虛滑한 症과 霍亂 吐瀉와 脈이 가늘어서 끊어지려 하는	354		
	596	中風の 脈은 陽이 浮하고 滑하며 陰이 濡하고 弱하다. 濕溫의 脈은 陽이 濡하고 弱하며 陰은 적고 急하다. 傷寒의 脈은 陰陽이 함께 盛하고 緊하며 濡하다. 熱病의 脈은 陰陽이 함께 浮한데 浮하면서 滑하고 沈하면서 散濇하다.	355~358	√	12
	596	陰厥에 脈이 沈하고 細한 것은 …… 陽厥에 脈이 滑하고 沈한 症은 ……	359, 360		
	596	脈이 더디며熱이 많고 寒이 적고 血이 弱한 것	361		
	596	數症이 있으니 動氣와 風濕과 脈이 虛한것이요	362		
	596	陽明이 少陽으로 더불어 病을 합하고 脈이 弦한 症	363		
	598	石膏 傷寒 熱病에 汗後의 脈이 洪大한 症과 頭痛하고	364		
	598	硫黃 傷寒의 陰症에 몸이 차고 脈이 가늘며 手足이 厥하고	365		
暑	600	暑에 傷한 脈은 虛하다. 脈이 虛하고 몸이 熱한 症은 ……暑가 氣를 傷하면 脈이 虛 弦 細 芤 遲하고 …… 中濕한 脈은 陽은 弱하고 陰은 虛하여 微하고 遲하여서 芤한 것과 같다…… 弦 細 芤 遲한 症은 다 虛脈이다. 暑脈은 虛하고 微弱하며 或은 浮大하고 滑아지며 或은 숨어서 보이지 않으니 …… 熱病은 脈이 盛하고 中濕는 脈이 虛한 것으로써 區分하면 된다	366~373	√	13
	601	中濕의 症勢는 六脈이 沈伏하고 冷汗이 스스로 흐르며	374		
	601	그 脈이 弦細芤遲하고 小便하고 나면	375		
	601	脈이 虛하고 微弱하며 煩渴하여 引飲하며	376		
	601	中熱이니 脈이 洪하고 緊盛하며 頭痛이 나고	377		
暑	602	清氣飲(一名 清暑益元湯) …… 氣력이 없고 脈이 虛細하고 遲한 것은	378		
	602	黃芪湯 中喝에 脈이 虛弱한 症	379		
	603	咳嗽하며 寒熱을 發하며 盜汗이 그치지 않고 脈이 잦은 것	380		
	606	蓼歸益元湯……, 조율기를 좋아하고 飲食이 減少하며 脈이 잦고 힘이 없는 症	381		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	608	濕에 傷한 脈은 細하고 濡하다 濕熱의 脈은 緩하고 大하다	382, 383		
	608	或澁하고 或細하고 或濡하고 或緩한 것은 모두 中濕으로 因한…… 脈이 浮하고 緩한 것은 濕이 表에…… 沈하고 緩한 것은 濕이 裏에 있다	384~386		
	608	脈이 弦하면서 緩하고 或은 緩하면서 浮한 症은 다 風濕이 서로 攻搏한 症이다	387		
	608	身痛하고 脈이 沈한 症은 中濕이요 脈이 浮한 症은 風濕이 된다	388, 389		
	608	寸口陰脈이 緊한 것은 霧露의 濁邪가…… 寸口陽脈이 緊하고 혹 濡을 먼 症은……	390, 391	√	14, 15
	608	陰陽脈이 함께 緊한 것은 上下 二焦가 ……吐利한 뒤에 脈이 緊하지 않고 ……	392		
	608	濕溫의 脈이 陽은 濡하고 弱하며 陰은 小하고 急하다	393	√	16
	609	中濕의 脈은 이것은 沈하면서 微緩한데	394		
	609	땀이 나고 몸이 차고 脈이 沈微하고 短氣하며	395		
	611	濕溫을 發하고 그 脈이 陽은 濡하고 弱하며 陰은 小하고 急하니	396	√	17
	611	人事不省하고 六脈이 다 작고 弱하면서 急하니	397		
燥	614	收斂을 主張하니 그 脈이 緊澁한故로	398		
	614	燥에 傷하면 脈이 濡한다. 脈이 緊하고 澁하며 或은 浮 弦하고 或은 芤 虛한것	399, 400		
火	616	火脈은 洪數한 法인데 虛하면 浮한다. 脈이 實하고 數한 것은 實熱이 있는 症이다. 脈이 浮하고 洪數하면 虛火가 있는 것이요 脈이 沈하고 實하면 實火다.	401~405		
	616	骨蒸과 勞熱의 脈은 數하고 虛하며 熱하고 澁하고 小하니……	406		
	616	虛火는 浮數하고 實火는 沈大한 것이니 …… 다스리는데 細數하면 해롭다	407~409		
	617	人蔘地骨皮散 ……을 다스리니 脈을 누르면 不足하고 들면 有餘한데	410		
	617	脈이 洪盛하고 有力한 것이 卽 그 症…… 脈이 虛弱하고 無力한 것이 卽 그 症……	411, 412		
	617	脈이 實하고 數한것은 實熱이다	413		
	622	흰 가래를 뱉고 말을 함부로 하고 脈의 緩急이 고르지 못하며	414		
	623	얼굴이 검고 脈이 躁하며 直視하고 ……	415		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	623	五蒸湯 骨蒸으로 潮熱하고 脈이 잦고입이 마르고	416		
	625	夏脈은 心인데 不及하면 心이 煩한다	417		
	625	몸이 痛하지 않고 脈이 緊數하지 않는것	418		
	626	泄瀉가 그치지 않고 脈이 가로 놓인 노곤과 같고 힘이 있었다	419		
	627	환자가 脈이 微하고 澁한 症은 …… 또 陰脈이 遲澁한 故로 ……	420	√	18
	627	血이 凝澁하면 脈이 通하지 않고 脈이 盛하고 大하면 瀼한故로 中寒한 것이다.	421		
	628	當歸補血湯 …… 面紅하고 脈이 洪大하면서 虛하고 무겁게 누르면 전연 없는 것	422		
	628	脈이 澁하면 반드시 물로 양치만 하는 症	423		
	629	補陰瀉火湯 …… 潮熱하며 盜汗하고 痰嗽하고 咯血하면서 脈이 數沈하고	424		
火	631	大熱이 있고 脈이 洪大한 症	425		
內傷	635	○寸口脈이 弱하고 遲한 경우, 弱 - 衛氣가 微한 症이요 遲 - 榮이 寒한 症	426		
	635	○寸口脈이 弱하고 緩한 경우, 弱 - 陽氣가 不足…… 緩 - 衛氣가 有餘	427		
	635	○寸口脈이 緊하면 胸中에 宿食이 消化되지 않은 것이 있는 것이다.	428		
	635	○脈이 緊해서 새끼를 꼬는것같고 일정하지 않는 것은 宿食이 있다.	429		
	635	○陽脈은 滑하고 緊한 경우, 滑 - 胃氣가 實…… 緊 - 脾氣가 傷	430	√	19
	635	○脈이 浮滑하고 빠른것은 飮食이 消化되지 않고 脾가 갈지 못한다	431		
	635	○氣口가 緊盛하면 飮食에 傷한 症이니 飮食이 소화되지 않으면 浮滑하고 疾	432		
	635	○勞役으로 內傷한 症은 脈이 豁大함…… 飮食으로 內傷한 症은 脈이 滑 疾 浮 沈	433, 434		
	636	傷食의 證은 氣口脈이 반드시 緊盛하고	435		
	645	氣口脈이 홀로 盛하고 緊하며	436		
	647	脈이 작고 차면 먹는 것을 즐기지 않는다	437		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	650	當歸補血湯 …… 물을 켜고 그 脈이 洪大하고 虛하며, 무겁게 누르면 全然 없으니	438		
	654	交泰丸 ○ 胸中이 痞滿하고 嘈雜하며 大便이 묽으면 脈中이 좀 快하고	439		
	654	寸口脈이 弱하고 緩할 경우에 弱 - 陽氣가 不足한 症이요 緩 - 胃氣가 有餘	440		
	657	飢 飢를 많이 먹으면 脈이 凝滯하고 色이 變하며	441		
	660	胸中에 막혔는데 上部는 脈이 있고 下部는 脈이 없으면	442	√	20
	660	脈이 浮하고 大한데 누르면 도리어 濇한故로 宿食이 있는 것을 아는 것	443		
內傷	660	脈이 數하고 滑한것은 宿食이 있는 症이니	444		
虛勞	664	平人으로서 脈이 크면虛勞가 있는 症이요 脈이 極히 虛해도 또한 虛勞인 症	445, 446		
	664	氣가 虛하면 脈이 弦하고 血이 虛하면 脈이 크다	447, 448		
	664	脈이 虛하고 細하며 弱한 症은 虛勞요 脈이 弦하고 大한데 弦한 것은 減脈이요 大한 것은 芤脈이다. …… 虛와 寒이 서로 치면 革이라고 이름하는데……	449, 450		
	664	寸口脈이 微하고 濇한데 微한 것은 衛氣가 衰한 症이요 濇한 것은 榮氣가 不足	451		
	664	脈이 오는 것이 軟하면 虛한 症이요 緩한것도 虛한 것이요 微한것도 虛한 것이요 弱한것도 虛한 症이다. 脈이 弦한것은 中虛인 것이다.	452~456		
	664	脈이 細하고 微한 것은 血氣가 함께 虛…… 脈이 작은 것은 血氣가 함께 작은 症	457, 458		
	664	脈이 大하고 芤한것은 奪血하고 血虛한 症이니 脈이 크기가 葱管과 같은	459		
	664	脈이 沈하고 遲한것은 脫氣한 症이다	460		
	664	平脈이 弦하고 大하면 勞損해서 虛…… 大하면서 無力한 것…… 數하면서 無力한 症	461~463		
	664	…… 或은 浮大하거나 或은 數大한 것은 …… 弦한 것은 ……	464, 465		
	664	만약 雙弦을 대하면 …… 數極한 症이 添加되면 危殆롭다.	466, 467		
	665	弦하고 清하면서 無力하면 氣虛가 되는 法이다. 脈이 沈微하고 無力하면 氣虛가 甚한 法이요 弦하고 微하면 血虛인 것이요 濇하고 微하면 血虛가 甚한 法이요	468~471		
	665	右脈이 浮하고 大하거나 或은 大하고 弦한 것은	472		
	665	右脈이 虛 微 細 弦한 것도 虛勞가 되는데	473		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	666	脈이 반드시 虛하고 濡하면서 자주 끊어지는 것이 마치 癰症과 비슷한데 다만 癰脈이 弦한데 虛脈은 大하고 弦한것이 區別	474, 475		
	668	大造丸 六脈이 虛微하고 血氣가 衰弱한 症	476		
	669	呼吸이 甚히 가늘고 脈이 커서 倫次가 없으니	477		
虛勞	669	脈이 微弱하고 氣力이 적고	478		
	670	固眞飲子…… 行步가 無力하며 때로 或 泄瀉하고 脈度가 沈弱하며	479		
	674	六味地黃元 ……骨蒸으로 痿弱하며 脈이 沈하고 虛한 症	480		
	678	小建中湯 …… 故로 脈이 弦하고 배가 아프며	481		
	683	煩悶하면 脈이 뻣히고 代하며 心이 動搖하고 行動이 動悸하면	482		
	683	平人의 脈이 큰 症이 勞가 되고 極虛한 症이 또한 勞가 되니 ……그 脈이 浮大하고 手足이 煩熱하며 …… 脈이 大한 症은 熱邪가 ……	483~485		
	684	溏泄을 내리고 脈이 緊하며 먹지 못하는 症	486		
	685	鹿肉 …… 脈이 끊어진 症과 筋이 拘急한 症	487		
霍亂	688	霍亂의 脈이 浮하고 洪하면 救할 수 있고, 微하고 遲하면서 말하지 못하고……	1, 2		
	688	脈이 많이 伏하면 끊어지기 쉽다. 脈代하면 霍亂하고, 代하면서 亂한 症도 ……	3, 4		
	688	脈이 滑하고 數하면 嘔가 되고 代한 脈은 霍亂이며, 微하고 滑한것은 살고 澁하고 數한 脈은 좋지 못하다.	5, 6		
	688	○ 脈이 가늘면서 澁하거나 或은 結하거나 或은 促하거나 或은 代한것은 다 死脈으로 斷定할 수 없으니 대체로 脈이 亂한때문이다.	7, 8		
	688	脈이 浮하고 大하면서 洪한 症은 救., 微하고 弱하면서 遲한症은 救하기 어렵다	9, 10		
	689	二香黃連散伏暑霍亂에 腹痛하고 躁悶하고 脈이 沈하고 수족이 冷한 症	11		
	689	加味薑附湯 …… 手足이 逆冷하고 氣가 적어서 말하지 못하며 六脈이 沈伏한 症	12		
	689	吐瀉脇痛轉筋에 脈이 弦한 症은	13		
	690	蓼胡三白湯 ○ 霍亂後에 煩熱하고 口乾하며 脈이 잣고或은 頭痛·身痛하는 症을	14		
	691	四肢가 厥冷하고 氣가 끊어지려 하고 脈이 洪大하면	15		
霍亂	691	팔목과 무릎을 지나며 六脈이 伏絶하고 氣가 喘하고	16		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	691	脈이 微遲하고 氣가 적어서 말하지 못하면	17		
嘔吐	693	寸口脈이 數하면 곧 吐한다. 寸口脈이 細하고 數한 경우에 數 -熱, 細 -寒	18, 19		
	693	陽氣가 微弱하고 膈氣가 虛하면 脈이 數하니	20		
	693	陽脈이 緊하고 陰脈이 數하면 먹은 뒤에 곧 吐한다 …… 脈이 滑하면 嘔吐한다	21, 22		
	693	단지 浮하기만 한 症은 …… 芤한 症은 瘀血이 ……가장 忌하는 症은 濇하고 弱한 것	23~25		
	693	脈이 緊하고 澁하면病을 고치기 어렵다. 脈이 弦한症은 虛한 것이니	26, 27		
	693	噎膈과 反胃에 脈이 浮하고 緩한症은 살고 沈하고 澁한症은 죽으며 脈이 澁하고 작은것은 血이 不足한 탓이요 脈이 大하고 弱한症은 氣가 不足한 症	28~31		
	694	加減理中湯 胃가 寒冷하여 清水와 冷涎을 嘔吐하고 脈이 沈하며 遲한症	32		
	694	和中桔梗湯 上焦가 熱하고 먹고 나면 暴吐하고 脈이 浮하며 洪한 症	33		
	695	黃連竹茹湯 胃가 熱하여 嘔吐하고 煩渴하고 脈이 잦은 症	34		
	696	嘔吐하고 脈이 弦한 症은 肝이 脾를 이긴 症이니	35		
	697	그 脈은 浮하고 洪하며 그 症은 먹고 나면 暴吐하고	36		
	697	그 脈은 浮하고 弦하며 그 症은 或은 먼저 吐하고	37		
	697	그 脈은 沈하고 遲하며 그 症은 아침에 먹은 것을 저녁에 吐하고	38		
	698	三陽에 熱이 났하면 脈이 반드시 洪數하여 힘이 있고	39		
	703	嘔吐에 脈弱小便不利하며 몸이 微熱하면서	40		
咳嗽	706	기침의 病因으로 脈이 浮한 症은 風이고 緊한症은 寒이며 數한症은 熱이고 細한症은 濕이며 房勞는 濇하고 難하다.	41~45		
	706	浮하고 短한症은 肺가 傷한 症	46		
	706	脈이 浮하고 緊한 症은 …… 沈하고 數한 症은 …… 洪하고 滑한 症은 …… 弦하고 澁한 症은 …… 脈이 細하면 …… 沈小하고 伏匿한 症은 다 …… 오직 浮하고 大하며 ……	47~53		
	708	風에 傷한 咳는 脈이 浮하고 憎寒하며 壯熱하고	54		

44 임승일·박훈평·나창수

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	709	脈이 緊하고 憎寒하고 發熱하며 땀이 없고	55		
	709	얼굴이 회고 脈이 弦하면 微涎이 나오고	56		
	709	橘蘇散 傷寒에 기침하고 身熱하여 땀이 있고 脈이 浮하고 數한데	57		
	710	半夏溫肺湯…… 嘈雜하며 清水를 침벨고 脈이 浮하고 弦하며 細하고 遲한 것은	58		
	710	기침하는 것은 脈이 數하고 煩熱하며 引飲하고	59		
	710	잠간 동안 그 脈이 洪하고 滑한 것은	60		
	711	小黃丸 熱痰 咳嗽에 脈이 洪하고 얼굴이 붉고 煩渴한 症	61		
	711	濕에 傷해서 咳하는 것은 脈이 가늘고 骨節이 煩痛하고	62		
	711	白朮湯 濕嗽에 痰이 많고 몸이 무겁고 脈이 濡하고 細한 症	63		
	711	白朮丸 濕痰과 기침에 몸이 무겁고 脈이 緩한 症	63		
	718	얼굴이 붉고 혹은 煩渴하여 引飲하고 脈이 洪하고 數하다	64		
	721	九味理中湯 寒喘을 다스리니 寒喘이란 症은 手足이 冷하고 脈이 沈細한 症	65		
	724	麥門冬湯 …… 몸의 땀이 기름과 같고 脈이 浮하고 洪하면서	66		
咳嗽	724	加味生脈散 脈이 伏하고 喘促하며 …… 눈이 돌아가고 脈이 가늘고	67, 68		
	725	氣가 短하고 비껴서 숨쉬며 그 脈이 平한것	69		
	725	神秘湯…… 氣로 하여금 流通하지 못하게 하고 그 脈이 沈하고 大하니	70		
	727	喘急하여 눕지 못하고 그 脈이 浮한데 누르면 虛하고 滿한것은	71		
	732	喘하고 눈이 脫狀하고 脈이 浮하며 大한 것	72		
	732	煩躁하면서 喘하고 脈이 浮한 것	73		
	733	寸口の 脈이 잣고 口中에 濁唾와 涎沫이 있는 것	74		
	733	가슴이 隱隱하게 疼痛하며 脈이 도리어 滑數한 것	75		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	735	胃가 차고 脈이 가늘며 혹은 吐하고 下하니	76		
	735	입이 쓰며 가슴이 가득하고 脈이 잦은症	77		
	737	咳하고 羸瘦하며 脈이 堅大하면 죽고 咳하면 …… 發熱하고 脈이 작고 緊急하면	77, 78		
	737	脈이 잦고 熱이 있고 喘嗽하며…… 어깨로 숨쉬며 脈이 浮하고 大하면……	79, 80		
	737	煩躁하고 脈이 없으며 몸이 차고 ……手足이 厥冷하고 脈이 흩어지고 또 數한 症	81, 82		
	737	脈의 보이는 것이 沈하고 微하고 散하면	83		
積聚	741	……얼굴이 푸르고 脈이 弦하고 길며 …… 얼굴이 붉고 脈이 잦고 實하며 …… 얼굴이 누르고 脈이 크고 虛하며 …… 얼굴이 희고 脈이 잦고 浮하며 …… 얼굴이 검고 寸口脈이 大하고 實하며 ……	84~88		
	742	鬱脈은 沈伏한症이 많고 或은 結하고 或은 促하며 或은 代한症이다.	89~92		
	742	鬱脈은 沈 濇하고 積脈은 弦 堅하다	93, 94		
	742	右脇에 있으면 積氣가 있으니 肺脈을 얻으면 結한 症…… 手脈이 반드시 沈伏한 症	95, 96	√	1
積聚	742	그 脈이 다 喘하고 數하며 ……그 脈이 弦하고 길며 ……그 脈이 다 큰 것이다	97~99		
	742	脈이 弦하고 緊하면 積인 症이요 脈이 弦하고 緊하며 微細하면 癥인 症	100, 101		
	742	積이 안에 있고 脈이 보이지 않으면 …… 한 脈이라도 서로 應하는 것이 있으면 ……	102		
	742	그 脈이 堅하고 強하며 急하면 살고 虛하고 弱하면 죽는다	103, 104		
	742	脈이 弦하고 伏한 症은…… 脈이 結緊한 것은 牢小한데 있고 沈實하며 或은 結하고 或은 伏하여 …… 實하고 強한 症은 살고 沈하고 小한 症은 죽는다	105~111		
	742	脈이 沈伏한 症은 骨에 붙고 肝이 弦하고 心이 芤하며 腎이 沈하고 急하고 脾가 實하고 또 長하며 肺가 浮하고 喘한 症 ……	112~117	√	2~6
	742	六聚는 結하고 沈하며 癰疾은 浮하고 結한다	118, 119		
	742	그 脈이 弦 ; 弦하면서 急한 症은 癥症이요 弦하면서 細한 症은 癥이 堅한 症	120, 121		
	742	脈이 沈重하고 가운데가 흩어지며 …… 沈重하면서 氣癥이 있는 것은 ……	122, 123		
	742	緊하면痛이 얹히게 되니 虛弱하면 죽고 實強하면 산다	124, 125		
	742	腹中에 積이 있으면서 脈의 虛弱한 것을 忌한다	126		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	742	婦人의 疝瘕와 積聚의 脈이 弦急한 症은 살고 작은 症은 죽는다	~128		
	743	가슴이 脹滿하고 갈비가 疼痛하며 脈이 沈하고 澁하니	129		
	743	陰寒을 만나면 문득 發하고 脈이 沈하고 濡하니	130		
	743	小便이 赤濁하고 脈이 沈하며 數하니	131		
	743	小便이 淋하고 大便이 붉고 脈이 沈하며 芤하고 澁하니	132		
	744	鼓脹痞塊를 兼하고 脈은 氣口가 緊하며 盛하니	133		
浮腫	769	風水이니 脈이 스스로 浮하여 ……皮水라고 하니 脈이 또한 浮하고 ……正水라고 하는데 脈이 沈遲하고 ……石水라고하니 脈이 沈하고 ……黃汗하는데 脈이 沈遲하고	134~138		
	761	모든 脈이 沈한 症은 …… 水病에 脈이 洪大한 症은 易治요 微細한 症은 難治다	139~141		
	761	水病에 脈이 實하면 살고 虛하면 죽는다 水氣가 沈脈을 얻으면 ……	142~144		
	761	水氣에 脈이 浮하고 大하면 可하고 沈하고 細하면 나았다가 다시 發한다	145, 146		
	761	上氣하고 浮腫하는데 脈이 浮하고 滑하면 可하고 微하고 細하면 難治다	147, 148		
	761	대체로 沈伏한 症이 많다 …… 脈이 반드시 沈數하고 ……脈이 반드시 沈遲하다	149~151		
	761	沈과 伏이 相搏하는 症을 水라고 하며	152		
	763	導滯通經湯 …… 飲食이 減少하고 脈이 弦細하면서 緩하니	153		
	766	脈이 끊어지고 입술을 벌리고 발이 부은 症	154		
脹滿	770	脈이 크고 堅하는데 濇한 症은 脈이다. 脈이 盛하는데 緊한 症을 脈이라고 한다.	155, 156		
	770	脹滿의 脈이 弦하면 脾가 肝의 制御를 받는 症이며 洪하고 數한 症은 熱脈이고 遲하고 弱한 症은 陰寒한 症이며 浮한 症은 虛滿이고 緊한 症은 實한 症이니 浮한 症은 다스리고 虛한 症은 危急한 症이다.	157~163		
	770	浮大한 症은 다스리며 虛하고 小한 症은 保全하기 어렵다	164, 165		
	770	脈이 반드시 浮하고 數하게 되니 浮하면 虛가 되고 數하면 熱이 되는데	166, 167		
	774	濟生紫蘇子湯 ……大小便이 不利하고 脈이 虛하고 緊하며 澁한 것인데	168		
	774	밤이면 더욱 甚하고 脈이 弦하면서 細하니	169		
	776	腹脹하고 몸이 熱하고 脈이 큰 것이 一逆이고	170		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
脹滿	776	四肢가 淸冷하고 泄瀉하고 脈이 큰 것이 二逆이며	171		
	776	배가 脹滿하고 便血하고 脈이 크면서 때때로 끊어지는 것	172		
消渴	778	脈이 實하고 大하면서 病이 오래된 …… 脈이 懸小하고 堅하면서 病이 오래된 ……	173, 174		
	778	消渴에 脈이 마땅히 堅實하고 찾아야 하는 것인데 도리어 沈瀼하고 가늘면難治	175, 176		
	778	消渴에 脈이 數大한것은 살고 細小하고 浮短한것은 難治다.	177, 178		
	778	心脈이 滑하면 渴이 되는데 …… 心脈이 微小한 것은 消瘵이 되는 것이니	179, 180	√	7, 8
	778	대체로 脈이 數하고 大한 것은 살고 沈하고 小한 것은 難治다	181, 182		
	778	心脈의 滑한것이甚한 것은 渴이 된다	183	√	9
	778	마땅히 數하고 大하여야 되는 것이며虛하고 小한 것을 忌한다	184, 185		
黃疸	787	脈이 沈하면 渴해서 물을 마시려 하며 小便이 不利한 症	186		
	789	五疸의 實熱은 脈이 반드시 洪數하고 혹 微澁한 症은 虛弱한데 屬한다	187, 188		
	789	疸에 脈이 緩大한 症은 順하고 弦急하므로 堅한 症은 逆한 症이다	189, 190		
	790	加減胃苓湯 黃疸에 飲食이 無味하고 行步가 倦怠하며 脈이 濡하고 濡한 症	191		
	792	心臟臟이 痞硬하고 自汗하며 小便이 利하고 脈이 緊細하며 空虛하니	192		
	792	茵陳吳茱萸黃蘗 陰黃에 일찌기 薑附諸藥을 먹어도 낫지 않으며 脈이 더딘 症	193		
	792	……黃이 發하고 脈이 沈細遲하고 無力하여 此劑로 藥을 쓰는데 茵陳附子湯에 ……	194		
瘧瘧	795	대개 黃疸에 寸口脈이 손바닥에 가까와서 脈이 없고口鼻가 차고 검으면	195		
	799	瘧疾의 脈은 대체로 弦한 症인데 弦하고 數한 症은 熱이 많고 弦하고 遲한 症은 寒이 많은데 弦하고 小하며 緊한 症은 下해야 하고 弦하고 遲한 症은 溫하게 해야 하고 弦하며 緊한 症은 發汗해야 하며 浮하고 大한 症은 吐해야 하고 弦하고 數한 症은 風으로 發해야 하는데 ……	196~203		
	799	瘧脈이 스스로弦하고 微하면 虛한 症이고 代하고 散하면 危險한 症	204~205		
瘧瘧	799	……스스로 弦한 症인데 弦하고 遲하면 寒이 많고 弦하며 數하면 熱이 많은 症이나	206~208		
	799	瘧脈은 弦한症이 많은 것인데 熱하면 弦하면서 遲한症을 띠고 또한 病이 오래되면 脈이 極히 虛하여 微하면서 無力하여 弦한 것같지 않으면서 반드시 虛하고 數한 가운데 弦한	209~211		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
		症이 보이되 다만 손끝은 들이받지는 않으니			
	799	弦하고 短한症은 飲食에 傷한 症이요 弦하고 滑한 症은 痰이 많으며 微하고 無力한症은 瘧疾이 오래된 症이다. 瘧의 脈이 遲遲하면 病이 스스로 낮는다	212~215		
	801	白虎桂枝湯 溫瘧에 脈이 平한 것같고 몸은 차지 않고 다만 熱하며	216		
	804	龍虎湯 …… 입술이 타고 코가 煙氣로熏한 것같고 六脈이 洪하고 緊한 症	217		
	808	瘧疾과 같으나 그렇다고 해서 脈이 꼭 弦하지도 않으니	218		
	810	人參竹瀝散 …… 痰이 盛하며 혀가 크고 말이 澁하고 脈이 虛하며 無力한 症	219		
	812	寒熱로 脫形하고 脈이 緊하고 博하면 다스리기 어렵다	220		
溫疫	814	尺膚가 熱이甚하고 脈이 盛하며 躁한 症은 溫病이다.	221		
	814	陰陽이 다 盛하면 熱病의 極한 症이니 浮하면서 滑하고 沈하면서 散澁한 것인데	222		
	814	陽脈은 濡弱하고 陰脈은 弦緊한데 다시 溫氣를 만나면 變해서 瘟疫이 된다	223	√	10
	814	몸이 熱하며 頭痛하고 배가 가득하며 飲食은 如常한데 脈이 直하고 疾하면	224		
	814	頭痛하고 배가 가득하여 吐하고 脈의 오는 것이 細하면서 強하면	225		
	814	도리어 利하고 脈의 오는 것이 澁한데 누르면 不足하고 들면 커지며	226		
	814	땀이 스스로 나는데 脈이 堅하고 強하며 急하면 살고 虛하고 軟하면 죽는다	227, 228		
	814	溫病에 계속해서 大熱이 나고 脈이 細小하면 죽는다	229		
	814	마땅히 땀이 나는 法인데 도리어 땀이 나지 않고 脈이 끊어지면	230		
	814	脈이 靜하고 땀이 이미 났어도 脈이 盈한症이 一逆이니	231		
	817	黑奴丸 瘟疫熱病에 脈이 洪數고 大하며 熱이 狂走하고 渴이 甚한데	232		
溫疫	820	變亂을 일으키니 傳染하는 症은 脈이 淨하지 않는 症	233		
邪祟	824	脈의 오는 法이 遲하고 伏하며 혹은 참새가 쪼는 것과 같은 症은 邪脈이고	234		
	824	脈이 ……弱하고 綿綿하고 遲伏하거나 或은 綿綿해서 度數를 알지 못하면서	235, 236		
	824	脈이 오는 法이 잠깐 컷다가 잠깐 작고 잠깐 잤다가 잠깐 길어지는 症	237		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	824	兩手の 脈이 浮浮하고 細微하며 綿綿하여서 알 수가 없는데 다만 陰脈이 있어서 또한 가늘고 綿綿하니	238		
	824	脈이 오는 것이 洪大하며서 弱한 症은 杜崇고	239		
	824	脈의 오는 것이 沈沈하고 瀦瀦하며 四肢가 무거운 症은	240		
	824	脈의 오는 것이 飄風과 같고陰을 쫓아서 陽으로 달아나는 것은	241		
	824	하나는 오는 法이 고르고 하나는 오는 法이 速한 것	242		
	824	心脈이 虛散하고 肝脈이 洪盛하며 或은 浮沈 長短 大小가 一定하지 않고 或은 錯雜하여 고르지 않다	243~246	√	11, 12
	824	잠깐 성글고 잠깐 잣고 잠깐 컷다가 잠깐 작아지고或은 促하고 或은 맺힌 症	247		
	824	疰脈이 浮大하면 다스리고 細數하면 難治인 症이다	248, 249		
	824	謔語하고 發狂하고 六部가 脈이 없는데 大指의 밑과 寸口위에 動脈이 있으니	250		
	824	脈이 沈沈하고 澤澤하며 四肢가 不仁한 症 …… 或은 大하면서 弱한데 弱한 症	251, 252		
	824	乍大乍小하고 乍短乍長한症은 鬼祟다	253, 254		
癰疽	829	모든脈이 浮하고 數하면응당 發熱해야 하는데 도리어 洒漸하게	255		
	829	脈이 微하고 遲한데 도리어 發熱하고 脈이 弱하고 數한데 도리어 振寒하는 症	256		
癰疽	829	脈이 浮하고 數하며 신체가 熱이 없고 얼굴이 黧黑하고 胸中에 약간 煩燥하며	257		
	832	數脈이 때가 맞지 않으면 惡瘡이 난다.	258		
	832	癰疽는 浮數하고 惡寒 發熱하며 만약 痛處가 있으면 …… 脈이 數하고 發熱하면서 疼痛한 症은 陽 …… 數하지도 熱하지도 痛하지도 않으면 陰瘡 …… 癰을 發하는 脈은 弦과 洪이 서로 攻搏하고 또 沈細하면서 直하는 症은 ……	259~263		
	832	浮하고 洪하며 滑한 症은 陽이고, 微하고 沈하며 緩하고 瀦한 症은 陰이다	264, 265		
	832	脈이 數하고 몸이 熱이 없으면 …… 몸에 熱도 없으면서 脈이 數하면 腸中에 膿……	266, 267		
	832	脈이 滑하고 數한데 數하면 熱이고 滑하면 實하다	268		
	832	瘡疽에 膿血이 大泄하고 脈이 滑大數한 것은 치료하기 어렵다	269		
	832	膿血이 기침으로 吐하고 脈이 洪滑하게 나타나면 낫기가 어렵다	270		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	832	煩痛하는 症은 毒이 全退한 症이 아니며 그 脈이 洪粗하고 또 힘이 없다	271		
	832	癰疽脈이 滯하고 澁한 症은 다만 和緩한 症을 얻으면 平하여지는 症이며 만약 洪하고 粗하면 銳毒을 收斂할수 없으니 고치기가 어렵다	272, 273		
	834	만약 脈이 沈實하면 먼저 그 안을 疎通하여 …… 脈이 浮大하면 먼저 托裏하여 ……	274, 275		
	835	內疎黃連湯 癰疽에 脈이 洪하고 實하면서 發熱하고 煩燥하고 臟腑가 秘澁한 것	276		
	836	문득 脈이 沈細하면서 煩悶하고 邪毒이 猛暴하며	277		
	836	形症이 곁에 있고 그 脈이 浮하고 氣가 盛하지 않으면	278		
	848	그 脈을 살펴서 短하고 澁하면저절로 낮고 浮하고 大한症은 치료하기 어렵다	279, 280		
	850	胃脈을 살펴야 하는데 그 맥이 마땅히 沈細할것이다	281	√	13
	850	脈이 洪數한 것은 膿이 이미 …… 脈이 遲緊하면 비록 膿이 되지 않았더라도	282, 283		
癰疽	850	胃中の 清氣가 下陷…… 胃脈이 沈細하고 寒氣가 阻隔…… 人迎이 緊盛하는 症이니	284		
	851	東垣托裏散 …… 一切의 惡瘡의 初發腫痛하고 脈이 洪數弦實하여 膿이 되려는 症	285		
	852	濕熱이 腸內에 鬱積하여 癰이 되고 脈이 더디며 堅한 症	286		
	852	脈이 芤하고 澁한 症은 …… 脈이 洪하고 數한 症은 ……	287, 288		
	852	腸癰이 알기가 어려운데 脈이 滑한 症은 推數해서 熱을 내려야	289		
	852	脈이 遲하고 緊한 症은 膿이 되지 않은 症이니 내려서 平하게 하고	290		
	852	脈이 洪하고 數한 症은 膿이 이미 된 症이니 내리지 않는 법이 마땅하다	291		
	852	腸癰의 脈은 滑하고 數하니 滑한 것은 實한 症이요 數한 것은 熱한 症이며	292		
	852	大黃牡丹湯 腸癰에 脈이 더디고 緊한症은 膿이 되지 않은 症이니	293		
	853	배가 疼痛하면 脈이 마땅히 沈細한것인데 이제 도리어 滑數하니	294, 295		
	861	千金消毒散…… 처음 發할 때에 脈이 洪數하고 弦實하여 膿이 되고자하는 症	296		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	866	灸法 …… 變色하지 않으며 脈이 沈하고 痛하지 않는 것을 깨달으면……	297		
	866	…… 脈이 實하고 膏粱한 사람이 마땅히 …….	298		
諸傷	906	脈이 實하고 무겁지 않은 것과 皮가 나와서 虛한 것과	299, 300		
	906	……脈이 虛하고 가는 것은 살고 數하고 實한 것은 죽으며 皮가 많이 나고 脈이 沈하고 작은 것은 살고 浮하고 大한 것은 죽으며 金瘡에 傷해서 皮가 나와 그치지 않고 脈이 큰 것은 七日만에 죽고 脈이 滑하고 細한 것은 살게 된다.	301~306		
	906	金瘡에 皮가 많이 나고 脈이 虛하고 가는 것은 좋고 實하고 大한것은 危殆하다	307, 308		
	906	傷한 것이 알아도 命脈이 虛하고 促하며…… 傷한 것이 重하여도 命脈이 和하고 緩하면	309, 310		
	906	피가 많이 나온 데 脈이 洪大하면 좋지 못하고 平正하고 重實하면 좋다	311, 312		
諸傷	911	속에 瘀血이 있고 그 脈이 堅強한症은 살고 小弱한症은 難治	313, 314		
	911	血出이 過多하면 脈이 마땅히 虛細하여야 되는 것인데 만약 急,疾,大,數하면	315, 316		
	911	臟腑의 致命한 곳을 傷하고 脈이虛促하면 危殆하다	317		
	911	蜂毒의 脈은 비녀와 같이 뻗뻗하다.	318		
解毒	923	百藥에 中傷한 脈이 浮洪하고 疾한 症은 살고 微細한症은 죽는다.	319, 320		
	923	脈이 洪大하고 遲한 症은 살고 微細하고 數한 症은 죽는다.	321, 322		
	926	蠶退紙 …… 비록 낮이 푸르고 脈이 끊어져서 昏迷하고……	323		
	933	尸厥이란 症은 脈이 움직여도 氣가 없고 氣가 단혀 서로 通하지 않는	324		
救急	933	氣가 끊어지지 않고 脈이 움직이는 것이 如常하든지 혹 秩序가 없거나혹 잠깐 컸다가 잠깐 작았다가 하거나 혹은 微細하여서 보이지 않고 心胸이 따스한 症	325~328		
	933	몸과 脈이 다 動하면서 知覺이 없고 송장과 같으므로	329		
	933	卒地에 죽고 脈은 오히려 움직이며 四肢가 逆冷하고	330		
	933	男子의 脈이 微弱하고 澁한 症은 자식을 낳지 못하는데	331		
婦人	954	微澁하면 精이 清하고 겸하여 虛冷이…… 脈이 微濡하면 ……	332, 333		
	954	남자의 脈이 微弱하고 澁하면	334		

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	957	先天歸一湯 ……經이 고르고 脈이 和하며 곧 孕胎한다	335		
	960	婦人의 足少陰의 脈이 움직이는 것이 甚한 것은 孕胎한 것	336	√	14
	960	脈이 滑疾한데 무겁게 손으로 눌러서 흠어지는 症은 胎가 이미 3月……. 무겁게 손으로 눌러도 흠어지지 않고 다만 疾하고 滑하지 않는 症은 5月이 된 것	337, 338		
婦人	960	婦人의 三部脈이 浮하고 沈한 것이 正等하고 끊어지지 않는 症은 妊娠한 ……	339		
	960	8月이면 脈이 實하고 大하고 牢하고 強하며 弦하고 緊한 것…… 細한 것 ……	340, 341		
	961	左手脈이 沈하고 實하면 男이요 右手脈이 浮하고 大하면 女이며 左右手의 脈이 다 같이 沈實하면 2男을 낳고 다 같이 浮大하면 2女를 낳는다	342~345		
	961	男女의 區別을 左右로써 取하는데 左가 疾하면 男이 되고 右가 疾하면 女가 되는 것인데 沈實한 것은 左에 있고 浮大한 것은 右에 있으니	346~349		
	963	保生湯 ……病이 있는 것같고 脈이 滑大하면서 六脈이 다 고른 것은	350		
	963	一方 …… 症勢가 더 심하고 脈이 左가 弦한 것이 甚하니	351		
	967	白扁豆散 …… 人事不省하고 그 脈이 浮하고 軟한 症	352		
	969	半產과 漏下하는 症은 革脈이 主하고 弱하면 血이 消耗되어서 ……	353, 354		
	969	少陰脈이 浮하고 緊하면 緊한 症은 疝瘕로 腹中이 疼痛하고 半產이 되어 ……	355	√	15
	969	解產하려는 婦人은 脈이 離經하여 沈細하고 滑하다	356		
	969	한번 숨쉬는데 脈이 여섯번 이르는 것이니 沈細하고 滑하며 陳痛이 허리에 ……	357		
	974	來甦散 臨產에 힘을 너무 써서 氣가 衰하고 脈이 微하며精神이 昏暈하고	358		
	986	下血을 過多한 것이 있으니 脈이 반드시 虛大하고 無力하며 臍속에 痛症이 ……	359		
	991	蓼朮膏 …… 補完할 수 있으니 그 脈을 보니 虛가 심하여	360		
	993	洪하고 實하여 고르지 못한 症은 ……沈하고 微하여 脈에 붙어서 끊어지지 않는 症	361, 362		
	993	解產한 脈이 沈하고 小한 것은 …… 實하고 大하며 強하고 急한 症은 ……	363, 364		
	993	解產한 脈이 緩하고 滑한 것을 …… 實大하고 弦急한 것은 …… 또 沈細하여 脈에 붙어서 끊어지지 않는 것은 ……	365~367		
	995	脈을 짚어보면 肝脈이 弦하고 寸口를 벗어나니	368	√	16

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번	맥 부위 표시	
				표시 어부	출현 순번
	995	땀이 저절로 흐르고 肝脈이 弦하고 길어서 寸口를 벗어나니 ……	369	√	17
	995	혹은 혼자서 웃고 혹은 울고 脈이 遲伏하고 혹은 雀啄과 같고	370		
	996	芙蓉散 …… 情慾이 火를 움직여 가슴이 아프고 自汗하고 불이 붉고 脈이 亂한 症	371		
小兒	1008	그 症勢가 놀란 것과 같고 重하면 熱이 壯하고 脈이 亂하며 數하고	372		
	1010	三歲로부터 五歲에 이르기까지는 한손가락으로써 …… 一息에 六~七번 이르는 것을	373		
	1010	七歲로부터 …… 한손가락으로써 三部脈을 눌러서 一息에 七~八至는 平和한 것이고, 八~九至는 發熱한 것이며, 五至는 속이 찬 것이다.	374~376		
	1010	小兒가 脈이 亂하면 다스리지 못하고 弦急하면 氣가 和하지 못하며 沈緩하면 飮食이 傷한 것이고, 促急한것은 虛驚이며 浮한것은 風이요 沈細한것은 冷한	377~382		
	1010	浮緩한 것은 風에 傷한…… 洪緊한 것은 寒에 傷한…… 數한 것은 熱…… 遲한 것은 寒	383~386		
	1021	불이 붉고 입술이 붉고 大小便이 黃赤하고 脈이 浮數洪緊하는데	387		
	1023	全身과 四肢가 차고 默默히 말하지 않으며 脈이 沈하고 遲한데	388		
	1023	口眼과 手足이 때때로 牽制하고 脈이 或은 浮하고 或은 沈하며	389, 390		
	1027	咽喉가 氣를 끊으며 呼吸이 굵고 크며 脈의 오는 것이 浮하고 數하면	391		
	1029	몸이 溫하기도 하고 冷하기도 하며 四肢가 冷하고 그 脈이 沈微하며	392		
	1064	얼굴이 희고 乳食을 吐하고 目睛이 푸르며 脈이 沈數하는	393		
	1064	小便이 붉고 渴症이 그치지 않으며 上氣가 急하고 脈이 洪數하는	394		
	1071	한번만 秘結하면 腸胃가 壅遏하고 脈이 맺히며 氣가 滯하여서	395		

별표 2. 寸關尺 配屬法이 表記된 脈診 醫案

원명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번
精	18	遺精과 白濁은 마땅히 尺脈에서 微驗하니 結 疝 動 緊이 2證의 脈이다.	1
氣	29	沈脈 弦脈 細脈 動脈은 모두 氣痛證이다. 心痛은 寸에 있고 腹痛은 關에 있으며 下部의 痛症은 尺에 있는데 脈象이 두텁이 나타난다.	2
夢	76	맥을 보니 兩手의 寸脈 다 沈하고 伏하였다.	3
津液	90	尺이 澁하고 脈이 滑하면 땀이 많다. 註釋에 가로되 尺膚가 澁하고 尺脈이 滑함	4
	90	肝脈이 浮虛하고 或濡, 或澁하니 自汗하는 症은 寸에 있고 盜汗하는 症은 尺에 있다.	5
	90	寸口脈이 가늘고 尺脈이 緊하면 그 사람이 虛損하고 多汗하며	6
痰飲	104	무슨 病이든지 百藥이 不效하고 關上脈이 伏하며 大하면 痰症이니	7
胞	144	寸關脈은 고르고 正常인데 尺脈이 끊어져서 이르지 않으면 月水가 不利하다.	8
	144	尺脈이 오면서 때때로 끊어지면 月水가 不利하고 肝脈이 沈하면 月水가 不利하며 尺脈이 滑하면 血氣가 實하므로 婦人은 經脈이 不利한 症이다.	9~11
蟲	159	關上脈이 緊하고 滑하면 蝨毒이요	12
	159	關上脈이 微하고 浮하면 積熱이 胃中에 있어서	13
	159	尺脈이 沈하고 滑하면 寸白蟲이 있고	14
小便	169	遺精과 白濁은 마땅히 尺脈에 微驗할 症이니 結 疝 動 緊의 脈은 위의 2症의	15
小便	169	두 尺脈이 洪하고 數하면 반드시 便이 濁하고 遺精한다.	16
	174	兩寸脈이 다 盛하면 關格이라고 하니	17
大便	190	大便이 閉結하고 脾脈이 沈數하여 밑으로 尺脈에 連하면 陽結이 되고 二尺脈이 虛하고 或 沈細하며 더디면 陰結이 되고 右尺脈이 浮하면 風結이 된다.	18~20

편명	수목 페이지	조 문 내 용	출현 순번
	190	風燥에는 右尺脈이 浮肥한 法이다.	21
	197	얼굴빛이 검고 발바닥이 때로 차며 尺脈이 虛하고 弱한 症이니	22
面	241	脈의 右關이 弦하고 緩하면서 浮를 띠고 있다.	23
眼	247	左寸脈이 洪數하면 心火가 炎上한 것이요, 關脈이 弦하고 洪하면 肝火가 盛한 것이며, 右寸關이 함께 弦하고 洪하면 肝木이 相火의 勢를 꺾서	24~26
	247	○눈병은 근본이 火에 있으니 …… 數하고 洪한 것이 右寸關이 나타나면	27
	247	○눈에 黑花가 보이는 症은 …… 左手尺脈을 診脈하면 沈하고 數한 것이	28
耳	281	左寸脈이 洪數하면 心火가 上炎하고, 兩尺이 洪數하면 相火가 上炎하니	29, 30
	281	暴病에 脈이 浮洪하는 것은 兩尺이 서로 같으며 或은 兩尺이 數하면 陰火 上衝	31, 32
鼻	290	左寸脈이 浮하고 緩하면 傷風한 것이니 …… 右寸脈이 浮洪하고 數하면 鼻衄 鼻鼈	33, 34
	290	穢氣가 있는데 脈이 弦少하고 右寸은 滑하며 左寸은 澁한데	35
口舌	296	左寸脈이 洪數하면 心이 熱하고 口가 乾하며 右寸脈이 浮數하면 肺가 熱하고 口가 乾하며 左關이 弦數하면 膽이 虛하고 口가 乾하며 洪實하면 肝이 熱하고 口가 乾하며 右關이 沈實하면 脾가 熱하고 口가 乾하며 洪數하면 口에 瘡가 나고	36~41
牙齒	308	右關脈이 洪數하고 或은 弦하고 洪하면 腸胃中에 風熱이 있어서 牙痛하고, 尺脈이 洪大하고 虛하면 腎이 虛한 法이니	42, 43
	308	○齒痛에 腎虛하면 尺脈이 濡하며 大하고, 火가 炎上하면 尺脈이 洪한다. 이가 성기고 動搖하고 빠지는 것은 右寸關이 數하고 或은 洪하며 弦하니	44~46
咽喉	317	兩寸脈이 浮洪하고 溢한 症은 喉痺한 症이고 脈이 微하고 伏하면 죽는다.	47, 48
	317	咽喉의 脈이 兩寸이 洪溢한 症은 上盛 下虛한 症이고 대체로 脈의 微伏은 忌	49, 50
胸	335	胸痺痛은 寸口脈이 沈하고 遲하며 關上脈이 小緊하고 數하다.	51
	335	脈이 沈 弦 細 動이 다 痛症이니 心痛은 寸脈에서 腹痛은 關脈에서 下部는 尺脈에서 脈의 形象이 顯然하게	52

편명	수목 페이지	조 문 내 용	출현 순번
	335	痞病에 右關脈이 弦한 것이 많다. 弦하고 遲하면 반드시 心下가 堅한 法이다	53
	344	枳實消痞丸 痞가 되고 惡食하고 懶怠하며 右關脈이 弦한 症	54
腹	357	尺脈이 弦하면 腹痛한다.	55
	357	尺脈이 緊하면 臍下가 痛하며 尺脈이 伏하거나 實하면 小腹이 痛한다.	56, 57
腰	365	○尺脈이 沈하면 腰背가 疼痛한다.	58
皮	375	脈이 浮하고 滿한 症은 氣血虛에 屬하니 關前이 그러하면 麻痺가 上體에 있고 關後가 그러하면 麻痺가 下體에 있다.	59
足	404	尺脈이 虛 弱하고 緩 滿하면서 緊하면 足痛이나 或은 痿痺이	60
足	409	脚氣가 心에 들어가면 …… 左寸脈이 잠깐 컸다가 잠깐 적고 또 잠깐 없어지니	61
	409	눈과 이마가 다 검고 左尺脈이 끊어지면 難治니	62
辨證	478	尺이 虛한 것을 重虛라고	63
診脈	482	六氣가 있는 곳에 人脈이 이르면 尺과 寸의 兩脈이 應하는 法	64
	487	寸脈이 밀으로 關에 이르지 못하면 陰氣가 끊어진 症이니 다 죽는다	65
吐	501	胸中에 填塞한데 兩寸脈이 主가 되고 兩尺脈이 보이지 않는 것은	66
風	516	혀가 굳어서 말하지 못하며 兩寸脈이 浮大하고 實急한데	67
	531	五物湯 다만 脈이 스스로 微하고 澁하고 寸口關上에 있어서 조금 緊하니 마땅히	68
寒	551	胸脇이 아프고 귀가 먹고 尺寸脈이 함께 弦한 症은 少陽이 病을 받은 症	69

편명	수목 페이지	조 문 내 용	출현 순번
		554 尺寸脈이 함께 沈하는데 沈하면서 빠르면 …… 沈하면서 더디면 ……	70, 71
		557 囊이 오르라지며 그 脈은 尺寸이 함께 微하고 緩한 症…… 그 脈이 散하고 浮하면 나으려…… 浮하지 않으면 낫기가 어려운 症이 …… 脈이 浮하고 緩하면 반드시 囊이 오르라지지 않고 …… 만약 尺寸脈이 함께 沈하고 短하면 ……	72~76
		558 尺 寸脈이 微 緩한 症은 厥陰이 病을 받은 症이니	77
		577 …… 寸脈이 浮하며 關脈이 沈하면 …… 寸脈이 浮하고 關脈이 細小沈緊하면	78, 79
寒	577	그 關脈이 위로 浮하는 症 ……結胸과 痞에는 關脈이 沈해야 하는 症	80, 81
	577	寸口關上의 尺中の 三處가 大小浮沈遲數이 同等하면 ……이것은 陰陽이 和平한 症	82
	588	脈이 뜨지 않으면 땀내지 못하고 脈이 微弱하고 或은 尺脈이 더디면 ……	83
	589	太陽病에 脈이 浮하고 緊하며 몸이 疼痛하면 ……가령 尺脈이 더디면 …… 안되는 症	84
	596	大便이 實하며 尺寸脈이 沈하고	85
濕	611	診察해 보니 脈이 關前에 濡하고 關後는 數하니	86
火	616	洪數이 左寸에서 - 心火…… 右寸에서 - 肺火…… 左關에서 - 肝火…… 右關에서 - 脾火…… 兩尺에서 - 腎經命門의 火…… 男子의 兩尺이 洪大한 것은 ……	87, 89
	620	五苓散 腎氣가 內虛하여 邪熱이 腎經에 흘러 들어가고 尺脈이 洪하고	90
內傷	635	右寸 氣口脈이 急하고 大하면서 數하고 때로 한번씩 代하고 澁한 것은	91
	635	右關의 胃脈이 損傷되어 弱한 것이 甚하면 숨어서 보이지 않고 다만 안으로 脾脈의 大 數微 緩하면서 때로 한번씩 代하게 나타나는 것은	92
	635	右關脈이 沈하면서 滑한 것은 宿食이 消化되지 않은 脈이다.	93

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번
	635	宿食이 消化되지 않으면 右關脈이 홀로 沈하면서 滑하게 된다	94
	636	左手關脈은 平和한데 右手關脈은 緊盛하니	95
內傷	654	寸脈이 緊한 것은 寒이 實한 症이니	96
虛勞	664	寸脈이 弱하면 胃를 損하고 浮하고 大하면 속이 枯槁한 症이요 尺脈과 寸脈이 함께 微하면 …… 左右가 다 微細하면 氣와 血이 다 남음이 없는 것	97~100
	683	尺脈이 緩하고 澁한 症을 解飭症	101
霍亂	688	關脈이 滑하면 霍亂과 吐瀉요, 또 滑하면서 고르지 못한 症은 ……代한 脈은 ……	102~104
嘔吐	693	寸脈이 緊하고 尺脈이 濡하면 가슴이 가득하여	105
	693	寸脈이 緊하고 滑하며 數하고 微한데 起因하는 症	106
	693	팔뚝길하여 목이 잠기는 症은 寸脈은 緊하고 尺脈은 澁하	107
咳嗽	706	右關이 濡한 症은 飲食이 脾를 傷한 症이고 左關이 弦하고 短한 症은 疲가 極	108, 109
積聚	741	心에 있으면 寸脈이 弦緊 ……에 있으면 關脈이 弦緊 臍下에 있으면 尺脈이 弦緊	110~112
	743	눕는 것이 게으르며 寸脈이 沈하고 滑하니	113
脹滿	770	關上脈이 虛한 症은 內脈이고 더디고 滑한 症은 脈이며 虛하고 緊澁한 症도 脈이고 或은 弦하고 遲하거나 또는 浮하고 數한 症도 다 脈이다.	114~118
痿痺	799	가령 寸脈이 微하면 陽이 不足한 …… 가령 尺脈이 弱하면 이를 陰不足이라	119, 120
癰疽	848	振寒하고 發熱하며 寸脈이 滑하고 數하며 …… 그 脈이 緊하고 數하면 아직 膿이 되지 않는 것이요 緊脈이 없어지고 數하기만 하면 膿이 이미 된 것이다.	121~123
怪疾	940	그 脈을 診察하니 左關이 浮促하거늘	124
婦人	954	求嗣의 脈은 순전히 尺脈에 있다 右尺脈이 旺盛하면 火가 動하고 色을 좋아하며	125, 126

편명	수록 페이지	조 문 내 용	출현 순번
	954	左尺脈이 旺盛하면 陰이 虛하고 福되지 못하며 오직 沈滑하고 고른 것이 ……	127
	954	여자가 生息을 잘하지 못하는 것도 역시 尺脈이 淸한것	128
	960	陰은 尺中이요 搏이란 손에 搏觸한다…… 尺脈이 搏擊하여 寸口脈과 달리 區別	129
	960	經脈이 運行하지 않은 것은 3月이 된 症이며 尺脈이 그치지 않는 症	130
	961	尺脈이 왼쪽이 편벽하게 크면 …… 오른쪽이 편벽하게 크면 …… 左右가 다 크면 ……	131~133
	961	左右의 尺脈이 다 같이 沈實하면 …… 그렇지 아니하면 …… 左右의 尺脈이 다 같이 浮大하면 ……	134~136
	969	尺脈이 轉急하여 노끈을 꿰는 것과 구슬을 구르는 것 같은 것은	137

별표 3. 달리 분류되지 않은 脈診 醫案

원명	수록 페이지	조 문 내 용	비 고
氣	29	趺陽脈이 浮하고 瀝한 때에 瀝한 것은 衛氣가 虛한 것이요	
	29	趺陽脈이 微하고 緊한 때에, 緊한 것은 寒한 症이며 微한 것은 虛한 症이고	
胃	135	얼굴이 熱한 症은 足陽明이 病들고 兩跗의 脈이 豎한 것도 足陽明이 病든 症	
寒	551	趺陽脈이 浮하고 瀝한데 浮하면 胃氣가 強한 症이고 瀝하면 小便이 잦으며	趺陽脈
內傷	635	趺陽脈이 浮하고 數한 경우, 浮한 것은 胃를 傷한 症이요 數한 것은 脾를 傷……	
嘔吐	693	趺陽脈이 浮하고 瀝한 경우에 浮한 症은 虛가 되고 瀝한 症은 脾가 傷한 症이니	
消渴	778	趺陽脈이 數하면 胃中에 熱이 있는 것이니	
審病	470	尺膚가 滑하고 澤脂한 症은 風이요, 尺膚가 濇한 症은 風痺요, 尺膚가 粗하여서 마른 고기의 비늘과 같은 症은 水溢飲이 있는 것이요, 尺膚의 熱이 甚하고 脈이 盛하고 躁한 것은 病溫이요, 尺膚가 寒하고 그 脈이 적은 것은 泄하고 氣가 적은 症이요	尺膚
小便	174	內經에 가로되 人迎脈이 氣口보다 4倍로 크면 格이 되고 氣口脈이 人迎보다 4倍로 크면 關이 되는 法이다.	
內傷	644	外感은 人迎脈이 浮緊하고 或은 洪大하고 數하다.	
	644	內傷은 氣口脈이 緊盛하고 或은 滑하고 疾하다.	氣口人迎
虛勞	664	男子의 久病에 氣口脈이 弱하면 죽고 強하면 사는 法이며 女人의 久病에 人迎脈이 強하면 살고 弱하면 죽는다	
咳嗽	726	平氣散 …… 大小便이 澁滯하고 氣口脈이 커서 보통 사람보다 倍나 되고 人迎脈이 沈하고 緩하면서 힘이 있으니	